





APICE PIANTE®

MICROPROPAGAZIONE E VIVAISMO DI QUALITÀ



Catalogo Generale



Benvenuti in



APICE PIANTE® è una delle più grandi e moderne aziende vivaistiche d'Italia. Trentacinque anni di esperienza e una grande passione hanno portato verso alti standard qualitativi, rispetto per la natura, competenza nella coltivazione e visione di mercato.



Ing. Luisa Di Primio Dr. Agr. Roberto Di Primio Dr. Agr. Cecilia Di Primio



APICE PIANTE

I numeri di Apice Piante...



+20

ETTARI DI
COLTIVAZIONE



+12

SERRE



+1

MILIONE DI
PIANTE COLTIVATE
IN CAMPO



+1,5

MILIONI DI
PIANTE PRODOTTE IN
LABORATORIO



+500

SPECIE
PRODOTTE



+2000

PEDANE EPAL
SPEDITE L'ANNO



+16

PAESI IN CUI
ESPORTIAMO



+40

ANNI DI
ESPERIENZA

Oltre

40

Anni di Attività



APICE PIANTE

Passo dopo passo...

- 1982** 1982 Inizio dell'attività vivaistica con la produzione di olivi autoradicali e coltivati in vaso.
- 1985** 1985 Costruzione della serra di ambientamento in vetro, con bancali mobili, climatizzazione e recupero acque piovane.
- 1986** 1986 Realizzazione ed inizio produzione del laboratorio di micropropagazione con cella climatica.
- 1996** 1996 Costruzione nuova sede uffici, realizzazione nuovo laboratorio di micropropagazione, celle climatiche e capannone per la lavorazione e conservazione.
- 1997** 1997 Costruzione serre di produzione con coibentazione a pallone e serra repository con protezione antinsetto.
- 1999** 1999 Ampliamento piazzali di coltivazione delle piante in vaso con irrigazione a goccia e coltivazione su pacciamatura.
- 2003** 2003 Costruzione capannone su due piani per la conservazione delle piante a radice nuda e preparazione, confezionamento, logistica.
- 2005** 2005 Ampliamento piazzali coltivazione e movimentazione delle piante.
- 2008** 2008 Realizzazione primo impianto fotovoltaico integrato al tetto.
- 2010** 2010 Realizzazione del secondo impianto fotovoltaico sul tetto e di una serra fotovoltaica per la totale autosufficienza energetica aziendale. 178.000 kg di CO₂ all'anno risparmiati.
- 2012** 2012 Inizio produzione piante da biomassa per l'alimentazione di impianti di produzione biogas, biomassa ecc.
- 2017** 2017 Installazione di impianto termico a cippato. Totale autosufficienza energetica.
- 2018** 2018 Costruzione nuove serre per la coltivazione di giovani piante propagate.
- 2019** 2019 Nuovi piazzali per la coltivazione delle piante in vaso.
- 2020** 2020 Ampliamento superficie aziendale e costruzione di 5 nuove serre di ambientamento.
- 2021** 2021 Costruzione di due serre repository.
- 2022** 2022 Incrementazione parco macchine altamente tecnologiche.
- 2024** 2024 Acquisizione di nuovi terreni per la produzione di piante a radice nuda.

I nostri principali contenuti puoi trovarli su:



Chiedici maggiori informazioni su WhatsApp



Questo è un catalogo multimediale, scansiona i QRcode che trovi nelle varie pagine, ti indirizzeranno a video, informazioni e consigli utili!

Inoltre partecipiamo alle principali fiere di settore nazionali e locali



Organizziamo corsi di formazione e convegni



Sostenibilità

ECO EFFICIENZA

“Soddisfare i bisogni della generazione presente senza compromettere quelli della generazione futura” è l’obiettivo dei nostri tempi e di APICE PIANTE, che condivide gli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Le nostre piante crescono in un ambiente sano e sicuro, nel rispetto delle tre virtù dell’eco efficienza: sostenibilità ambientale, sociale ed economica.




Ing. Luisa Di Primio

L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e la nostra azienda riconoscono un legame stretto tra il benessere umano, la salute dei sistemi naturali e la presenza di sfide comuni per un pianeta verde.



Apice Piante nel pratico...





Canna comune *Arundo donax* L. (Poaceae)

Canna gentile, Canna domestica, Canna comune

EN. Giant Reed **FR.** Canne de Provence, Roseau à quenouilles **DE.** Pfahlrohr **ES.** Caña común

L'Arundo è in assoluto la pianta che produce più massa vegetale per anno di qualsiasi altra pianta. Può essere coltivata senza uso di trattamenti e diserbanti, sopporta la siccità. È coltivabile in tutte le regioni tranne le zone alpine. Una volta fatto l'impianto con una pianta per metro quadro questa colonizza tutto il terreno in due-tre anni e vive per decenni in quanto il forte rizoma sotterraneo si rinnova anno dopo anno. A fine coltura si eradica facilmente semplicemente portando all'aria il rizoma con ripper o estirpatori.

La biomassa prodotta può essere utilizzata in moltissimi modi, principalmente per:

- Biomassa da insilare ad alto potere metanigeno per la produzione di biogas in sostituzione parziale o totale del mais.
- Biomassa legnosa ad uso combustibile, il cippato ottenuto può essere utilizzato in impianti di riscaldamento, per la produzione di energia elettrica da biomassa, per la trasformazione in pellet ad alto potere calorifero e basso costo.
- Biomassa legnosa per alimentazione di impianti a pirolisi con produzione di syngas.
- Biomassa per la produzione di Etanolo ad uso industriale e per autotrazione in sostituzione parziale o totale della benzina.
- Biomassa per usi civili ed edili mediante l'estrazione di cellulosa.

Il nuovo impianto si realizza quasi esclusivamente con piante micropropagate in laboratorio in quanto sono sane, vigorose, provviste di zolletta di terriccio che ne assicura l'attecchimento. È di facile impianto con le comuni trapiantatrici per ortaggi.



Accestimento in vitro



Piante ambientate in serra



Crescita dopo tre mesi

Il laboratorio di Micropropagazione

La **MICROPROPAGAZIONE** realizzata nel moderno laboratorio è alla base del ciclo produttivo. Le piante **MICROPROPAGATE** sono **MIGLIORATE**: sane, esenti da virus e batteri, vigorose e di prima generazione. L'alta qualità prodotta per gli impianti professionali a disposizione anche dell'hobbista. Tutte le piante hanno la certificazione Comunitaria C.A.C. e **VIRUS ESENTE** garanzia di qualità fitosanitaria e genetica.



Dr. Agr. Cecilia Di Primio



Fase di sterilizzazione



Lavorazione sotto cappa sterile

PIANTA MICROPROPAGATA
+ produttiva + longeva
+ sana



Spedizione su carrelli o in box di cartone



Crescita in cella climatica



Ambientamento in serra

Piante micropropagate



Bounty



Canna arundo donax



Carciofi 5 varietà



Fichi 22 varietà



Giuggioli 2 varietà



Kiwi 5 varietà



Lamponi 13 varietà



Melograni 4 varietà



Mirabolano 29 C



Mirtilli 20 varietà



More 7 varietà



Noccioli 3 varietà



Pescomardorlo GF 677



Phormium rossi - verdi 6 varietà



Portainnesti nanizzanti



Serra di ambientamento



Uvaspina - Ribes 7 varietà



Viti selvatiche virus esenti

Certificati

CERTIFICAZIONE

Apice Piante partecipa al sistema nazionale volontario del materiale di propagazione vegetale del Mipaaf, quindi è certificata a vari livelli: C.A.C. e VIRUS ESENTE. Pertanto c'è la massima garanzia fitosanitaria grazie al controllo dell'OSSERVATORIO DELLE MALATTIE delle PIANTE regionale che autorizza l'emissione dei cartellini per ogni singola pianta o alveolato.



Certificazione C.A.C.

Nuovo collarino multistrato in plastica resistente completo di tutte le informazioni a norma di legge

Negli ultimi anni, alla certificazione si è affiancata la cartellinatura con la **TRACCIABILITÀ** della produzione, mediante l'implementazione di un nuovo sistema informatico che permette il controllo di tutta la filiera della produzione. Tale sistema permette di originare, per ogni pianta, un codice a barre con codifica industriale contenente tutte le informazioni necessarie alla rintracciabilità. Dal 14 dicembre 2019, inoltre, è entrato in vigore il regolamento UE 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante che prevede l'applicazione di un passaporto delle piante proprio per garantirne la rintracciabilità.

Passaporto europeo e certificazione CAC Codice di rintracciabilità Nome varietà e Clone Indicazione del portainnesto* Codice partita

Vedi tabella sotto

PLANT PASSPORT - PZ
A: PRUNUS AVIUM
B: IT-013-0035
C: .9900010021
D: IT

CILIEGIO NEW STAR (AUTOFERTILE) COLT 17
V.24 P35
Autofertile. Rapida messa a frutto e buona produttività: frutto molto grosso, uniforme; polpa consistente. Maturazione III° decade di Maggio.

APICE PIANTE
Via Val di Foro, 45
Ripa Teatina (CH) ITALY
Tel./Fax: +39 0871 399121
e-mail: info@apicepiante.eu

Misura del vaso Posizione di provenienza Descrizione sintetica ed epoca di maturazione

PASSAPORTO DELLE PIANTE / PLANT PASSPORT

A la lettera «A» denominazione botanica
B la lettera «B» seguita dal codice di due lettere per lo Stato membro in cui l'operatore professionale che rilascia il passaporto è registrato, un trattino e il numero di registrazione dell'operatore professionale
C la lettera «C» codice di tracciabilità della pianta
D la lettera «D» stato membro di origine

PORTAINNESTI PRINCIPALI:

- | | |
|---|---|
| TA = Pianta da talea | NAN = Portinnesto nanizzante |
| SE = da seme | SL = Santa Lucia o Magaleppo |
| FR = Pianta su franco da seme della stessa varietà | GF677 = Pesco mandorlo GF677 |
| ME = Pianta da meristema | 29C = Mirabolano 29C da meristema |
| COLT = Colt | MR = Mirabolano |
| GI = Gisela® | CO = Cotogno |
| | M / MM = Vari tipi di meli clonali |

Certificati per piante VIRUS ESENTI

PASSAPORTO DELLE PIANTE / PLANT PASSPORT

SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE Abruzzo
DEN. BOTANICA L.P. Persica
VARIETA' SUNCREST
PORTAINNESTO GF677
CARTELLINO VALIDO PER N. 1 PIANTA

NORME E REGOLE UE - ITALIA
ANNO EMISSIONE 2023
CATEGORIA CERTIFICATO
CODICE RUOP IT0130035
COD. ID CH001 Nr. 000000

QVI
QUALITÀ VIVAISTICA ITALIA

NUOVE FOTO E NUOVI CARTELLINI

Tutte le piante prodotte in vaso sono provviste del collarino della certificazione e rintracciabilità e dalla **foto originale ed esclusiva APICE PIANTE** completa sul retro della descrizione, delle note tecniche sull'impianto e coltivazione e sui consigli sulle concimazioni e sui trattamenti. Inoltre c'è la codifica EAN 13 della varietà e Unix della specie per tipologia di vaso.



Piante per produzione intensiva

Piante con portainnesto nanizzante

Il sistema intensivo (800-1000 piante/ha) e superintensivo (1.600- 3.200 piante/ha) è basato sull'allevamento degli alberi ad asse centrale o a vaso basso ed elevata densità di piantagione, atti a formare una parete produttiva continua.

Come si effettua?


Grazie al **portainnesto nanizzante** che conferisce alla pianta un minor vigore, migliorandone la produttività.

Vantaggi tecnici:

- Ridotta dimensione degli alberi
- Precoce entrata in fruttificazione delle piante
- Maggiori rese produttive degli impianti
- Maggiore efficienza d'uso delle macchine
- Riduzione delle spese di potatura e raccolta

Vantaggi hobbistici:

- Coltivazione in vaso anche su terrazzi e balconi
- Pianta ad altezza d'uomo



Impianto intensivo con piante nanizzanti allevate a spalliera



Impianto intensivo con piante nanizzanti allevate a colonna

Piante per produzione intensiva



Piante allevate ad alberello Vaso 20

Vaso 24



Piante allevate a COLONNA in vaso

APICE PIANTE
MICROPROPAGAZIONE E VIVAISMO DI QUALITÀ

la buona frutta

Prodotto in Italia

**La differenza è
il portainnesto nanizzante**

2,5 m

*Pianta con portainnesto
NANIZZANTE*

3,5 m

*Pianta con portainnesto
TRADEZIONALE*

Pianta professionale alla portata di tutti

NOVITÀ

BASSA

FORTE

COMODA



**Consigli su cura
delle piante**

L'importanza della prima
potatura su alberi
da frutto e dei
porta innesti scelti.


Piante per produzione intensiva




Melo sesto di impianto 3.8x0.8 m - 3280 piante/ha



Melo al primo anno



Ciliegio sesto di impianto 4x1 m - 2500 piante/ha



Ciliegio al secondo anno

Piante per produzione intensiva



Mandorlo sesto di impianto 5x2.5 m - 800 piante/ha



Mandorlo al primo anno



Pero sesto di impianto 4x1 m - 2500 piante/ha



Melograno al terzo anno sesto di impianto 4.5x2.5 m - 880 piante/ha

Novità - Frutti vitaminici e nutraceutici

Asimina triloba

Asimina triloba L. (Annonaceae)

L'asimina meglio conosciuta come banano di montagna è un albero da frutto a foglia caduca molto resistente al freddo. I frutti sono grandi bacche ovali lunghe dai 6 ai 18 cm. I frutti contengono numerosi semi bruni, disposti in due file, molto duri. La polpa del frutto è a consistenza densa, cremosa, di colore tendente al giallo, è dolce e profumata. La polpa del frutto è ricca in vitamine e sali minerali.



Limone caviale

Citrus australasica (Rutaceae)

Detto anche Finger Lime è un agrume di origine australiana. Il nome deriva dalla presenza all'interno del frutto di vescicole che assomigliano al caviale e si rompono in bocca con sapore simile al limone. Ricco di vitamina C, B6, acido folico e potassio, è rinfrescante e gradevole.



Feijoa

Acca sellowiana (Myrtaceae)

Alberello sempreverde a crescita lenta con foglie scure e lucide. Fiori rosacei con numerosi stami rossi. Frutti con buccia verde dura e polpa chiara e morbida. Sapore tipico dolce ed acidulo con profumo intenso, molto ricco di vitamine. I frutti maturi cadono spontaneamente in Ottobre e si conservano per alcuni giorni.



Nespolo gigante innestato

Eriobotrya Japonica (Rosaceae)

Il nespolo del Giappone viene coltivato a scopo commerciale per il suo frutto, e anche a scopo ornamentale in quanto è un albero sempreverde, di medie dimensioni e con foglie molto grandi. I frutti di questa varietà innestata sono molto grandi, dolci a maturazione piena, dissetanti e rinfrescanti. La maturazione avviene in maggio-giugno, mentre la fioritura si ha in dicembre-gennaio.



Novità - Frutti vitaminici e nutraceutici

Tayberry incrocio Mora-Lampone *Rubus Fruticosus x Idaeus* (Rosaceae)

Arbusto simile alla mora e al lampone da cui deriva, predilige terreni soffici ben dotati di sostanza organica. Produttivo. Frutti grandi di ottimo sapore, ricchi di antiossidanti. Maturazione fine maggio.



Avocado *Persea americana* (Lauraceae)

Pianta tipica dell'America centrale può essere coltivata in ambienti temperati mediterranei e con bassa resistenza al freddo fino a qualche grado sotto lo 0. Albero sempreverde a rapido accrescimento, ornamentale con foglie grandi e lucide. Fiori ermafroditi generalmente autosterili di tipo A e B asseconda della recettività del polline. Un abbinamento tipico è della varietà Hass, la più piantata al mondo, con la varietà Fuerte. I frutti appena raccolti sono duri ma ammorbidiscono fino a raggiungere una consistenza burrosa.



Carrubo autofertile *Ceratonia siliqua* L. (Fabaceae)

Il carrubo è un albero, sempreverde, robusto, a chioma espansa. Questa nuova varietà selezionata presenta fiori maschili e femminili sulla stessa pianta contemporaneamente, dunque è autofertile. Il frutto è marrone scuro, maturo tra agosto e ottobre ed è un grande baccello, lungo 10-20 cm con polpa carnosa, pastosa e zuccherina che indurisce col disseccamento.



Dragon fruit *Hylocereus undatus* (Cactaceae)

Il dragon fruit già dal nome è accattivante, è un frutto raro da vedere e che spesso si utilizza come ingrediente esotico sia per la sua forma sia per il suo sapore. L'aspetto di questa pianta è quello di una pianta grassa. Il frutto ha la polpa bianca o fuxia punteggiata da moltissimi semi di color nero dal sapore delicato.



Frutti vitaminici e nutraceutici

Carciofo *Cynara scolimus L. (Asteraceae)*

EN. Artichoke FR. Artichaut DE. Artischocke ES. Alcachofa

Pianta perenne a fusto raccorciato a rosetta con vegetazione autunno-primaverile. Nel periodo estivo la pianta va a riposo vegetativo e la parte superiore, al di sopra del terreno viene asportata. La nuova vegetazione culmina con un capolino terminale al quale segue la produzione di numerosi capolini laterali.



Riprodotta da micropropagazione dà origine ad una pianta sana e vigorosa con capolini di piccole dimensioni senza spine di ottimo sapore. Ideali per conserva perchè privi di pelo. **Maturazione primaverile.**



Riprodotta da micropropagazione dà origine ad una pianta sana e vigorosa con capolini di grandi dimensioni compatti, di forma sferoidale conica senza spine. **Maturazione da febbraio.**



Varietà tipica dell'Italia centrale conosciuta con diversi sinonimi. Capolini grandi compatti di forma sferoidale, color viola senza spine. **Maturazione da marzo.**



Carciofi in blister da 40 fori

Carciofi:

	novembre	dicembre	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio
Romanesco precoce C3							
Romanesco tardivo C3							
Mazzaferrata Abruzzese							
Nostrano							

Frutti vitaminici e nutraceutici

Melograno *Punica granatum* (Punicaceae)

EN. Pomegranate FR. Grenadier DE. Granatapfelbaum ES. Granado

Rustico nelle regioni con inverni miti, richiede una buona umidità del terreno e clima mediterraneo per fruttificare normalmente. Raccolta in autunno. Altezza da 2 a 3 m. Sono disponibili diversi cloni.



Varietà affine alla tradizionale "Dente di cavallo", dalla quale si differenzia per la buccia fine, una migliore disposizione degli spicchi e la presenza di una placenta sottile che facilita la separazione degli arilli. Presenta un albero mediamente vigoroso e rustico, di eccellente produttività, simile a Wonderful. I frutti hanno pezzatura media, tra Acco e Wonderful, fino a 600 g., con una resa in succo più elevata di Wonderful, per effetto della buccia sottile. La buccia presenta colore del fondo giallo aranciato e sovracoloro rosa, molto simile alla Mollar de Elche. Gli arilli sono di colore rosso intenso, grossi, aromatici e succosi, di gusto dolce, oltre 16° Brix, con bassa acidità intorno a 0,70%, espressa in acido citrico. Il seme è di piccolissime dimensioni e mediamente duro. **Matura tra la fine settembre-inizio ottobre**, circa un mese prima di Wonderful, resiste bene alle manipolazioni. Ottima attitudine alla frigoconservazione, oltre 5 mesi come Wonderful.



Seme erbaceo. Frutto grande, buccia bianco-rossa, arillo rosso chiaro, dolci, grandi. Frutto attraente adatto soprattutto per il consumo fresco. **Maturazione fine settembre**.



Frutto grande, buccia rosso scuro, arilli color rubino intenso. Attualmente è la varietà più richiesta dal mercato mondiale per la produzione di succhi ricchi di antiossidanti. **Maturazione fine ottobre-inizio novembre**.

	luglio			agosto			settembre			ottobre			novembre		
Melagrane:															
Red Horse®															
Melo Dolce®															
Wonderful															



Olivicoltura intensiva

La moderna olivicoltura si sta orientando verso la scelta di metodi di coltivazione meccanizzabili sia per la raccolta che per la potatura al fine di abbattere i costi di produzione e rendere le operazioni colturali rapide e semplici, incrementando notevolmente la resa per ettaro e la redditività. Questi obiettivi si possono raggiungere con sesti di impianto di mt 4x1, allevamento a siepone, scelta di varietà idonee: autofertili o molto produttive a crescita contenuta e con rami esili e flessibili.



Fase di
Radicazione



Vasetto
7x7 cm



Raccolta meccanica con macchina
scavallatrice



Nuovo sistema di allevamento
a vaso basso



Impianto al secondo anno
in produzione



Bancale di radicazione olivo

Olivicoltura intensiva

Olivo (*Olea europaea* L.)



Albero di contenuta vigoria con comportamento pendulo con rami piuttosto lunghi e carichi di drupe spesso a grappolo. Varietà autofertile, molto produttiva. Pezzatura media di forma sferica. Varietà resistente alla Xylella Fastidiosa.



Albero di media vigoria con portamento espanso e foglia rotondeggiante. Varietà autosterile che necessita di impollinatore, molto produttiva e di precoce messa a frutto. Varietà adatta per olivicoltura intensiva e superintensiva resistente al freddo ed alle più comuni malattie dell'olivo. Olio di elevata qualità fruttato.



Albero di media vigoria di precoce e costante messa a frutto. Varietà autosterile che necessita di impollinatori adatta per olivicoltura semi e superintensiva. Frutto grande, cangiante con maturazione medio precoce. Olio di elevata qualità fruttato, con note di pomodoro ed erbaceo.



Albero di media bassa vigoria con portamento tendenzialmente pendulo, internodo corto e foglia piccola lanceolata adatto per olivicoltura superintensiva. Varietà autofertile molto produttiva con precoce messa a frutto fin dal secondo anno. La raccolta tardiva e le piccole dimensioni della drupa conferiscono alla varietà una alta resistenza alla mosca delle olive. Olio fruttato profumato di ottima qualità.



Albero di modesto vigore con portamento tendenzialmente pendulo, internodo corto e foglia piccola molto adatto per olivicoltura superintensiva. Varietà AUTOFERTILE molto produttiva con precoce messa a frutto fin dal secondo anno. Frutto di medio piccole dimensioni cangiante a maturazione. Olio fruttato leggero con note erbacee se raccolto leggermente in anticipo.

Olivo (*Olea europaea* L.)

EN. Olive FR. Olivier DE. Olivenbaum ES. Olivo

Fogliame persistente, stretto, grigio-verde sopra e argentato sotto. Resiste bene alla siccità e ai venti forti ma teme l'umidità. Altezza: da 2 a 8 m. Forma arrotondata. Crescita lenta. Resiste a -6°/-8°C. Le principali varietà descritte, ottenute da innesto o da talea autoradicata, sono allevate in vaso fuori terra e predisposte per l'allevamento a monocono sesto 6x3 o a vaso da 6x6 a 5x5.

Principali varietà



Albero vigoroso con portamento tendenzialmente pendulo. Foglia lanceolata di media grandezza e colore verde chiaro. Frutto di colore nero alla raccolta, forma ellissoidale, calibro medio-piccolo (v.m. 3 gr.) di media resa in olio. **Produttività buona.** Varietà da olio che, in annate di scarica può essere utilizzata come oliva nera da mensa.



Albero mediamente vigoroso con portamento tendenzialmente pendulo. Foglia ellittica di media grandezza e colore verde cupo. Frutto di forma ovoidale di calibro medio-grosso (v.m. 5 gr.) di buona resa in olio. **Produttività elevata.** Varietà da olio apprezzabile per la precocità di entrata in fruttificazione e per l'olio prodotto particolarmente fruttato.



Albero mediamente vigoroso con portamento assurgente ma rametti a frutto penduli. Foglia lanceolata di media grandezza e colore verde lucido. Frutto di colore ancora cangiante alla raccolta, forma ovoidale allungata, calibro medio-piccolo (v.m. 3,2 gr.) di buona resa in olio. **Produttività elevata** ed olio di elevata qualità, fruttato. Varietà da olio sensibile alla rogna dell'olivo. **DISPONIBILE NUOVO CLONE RESISTENTE ALLA ROGNA.**



Albero mediamente vigoroso con portamento espanso. Foglia ellittica di media grandezza, e colore verde lucente. Frutto di colore rosso vinoso alla raccolta, forma ellissoidale, calibro medio-piccolo (v.m. 2,4 gr.) di buona resa in olio. **Produttività elevata** e costante ed olio di elevata qualità. Varietà da olio particolarmente idonea alla raccolta meccanica.



Albero vigoroso con portamento tendenzialmente assurgente. Foglia ellittica, grande e colore verde scuro. Frutto cuoriforme di calibro medio-grosso (v.m. 5,2 gr.) di media resa in olio. **Produttività elevata e costante.**



Albero vigoroso con portamento espanso. Foglia di media grandezza di colore verde chiaro. Frutto di forma ovoidale, di calibro medio (v.m. 5,3 gr.) nero, di media resa in olio. **Produttività elevata.** Varietà da olio (talora in annate di scarica anche da mensa) apprezzabile per la precocità di entrata in fruttificazione.



Albero vigoroso con portamento espanso. Foglia di media grandezza di colore verde scuro. Frutto cangiante di forma ovoidale e calibro medio (v.m. 3,5 gr.) di buona resa in olio. **Produttività buona.** Ottima la qualità dell'olio è tra le varietà più resistenti al freddo.

Varietà molto resistenti al freddo



GENTILE DI CHIETI: albero vigoroso con portamento assurgente. Foglia di media grandezza di colore verde scuro. Frutto nero violaceo di forma ovoidale e calibro medio (v.m. 3,5 gr.) di buona resa in olio. **Produttività buona.** Ottima la qualità dell'olio è tra le varietà più resistenti al freddo.



Albero mediamente vigoroso con portamento tendenzialmente pendulo. Foglia ellittica di media grandezza e colore verde scuro. Frutto di colore tipicamente rossastro alla raccolta, da cui il nome, forma ovoidale, calibro medio-piccolo (v.m. 2,4 gr.) di buona resa in olio. **Produttività elevata** non molto costante.



Albero di modesto vigore con portamento assurgente. Foglia breve e stretta di colore verde scuro. Frutto cangiante di forma ellissoidale e calibro medio (v.m. 3,8 gr.) di buona resa in olio, elevata qualità, fruttato. **Produttività buona.** Varietà da olio sensibile alla rogna dell'olivo.

Varietà da Tavola



Albero poco vigoroso con portamento assurgente. Foglia ellittica di media grandezza e di colore verde scuro. Frutto ellissoidale cangiante alla raccolta. Calibro grosso (v.m. 7,5 gr.) con nocciolo medio. **Produttività media.** Varietà a duplice attitudine, olio e mensa.



Albero poco vigoroso con portamento medio. Foglia ellittica di colore verde scuro. Frutto di forma sferoidale di calibro grosso (v.m. 9,5 gr.) rosso vinoso con polpa tenera di ottimo sapore adatta per la salamoia e per olive ripiene. Nocciolo mediamente grande. **Produttività media.** Varietà da mensa, caratteristica, con una buona resistenza al freddo.



Pianta mediamente vigorosa e rustica. Maturazione tardiva ed alta resistenza al distacco. Pezzatura uniforme, polpa consistente e resistente alla concia. **Produttività alternante se non ben potata.** È una delle migliori varietà da mensa.



I frutti alla raccolta non sono amari, pertanto si prestano ad essere usati facilmente in cucina sia verdi che neri a completa maturazione. **Produttività costante.** Polpa consistente adatta anche per la concia in salamoia.




Albero mediamente vigoroso con portamento medio. Foglia grande ellittico-lanceolata di colore verde scuro. Frutto di colore rosso vinoso alla raccolta forma ellissoidale di calibro medio-grosso (v.m. 4,5 gr.) di buona resa in olio. **Produttività buona.** Varietà a duplice attitudine, olio e mensa, caratteristica per la maturazione media e per una certa resistenza al freddo.



Albero vigoroso con portamento assurgente. Foglia grande ellittico-lanceolata di colore verde scuro. Frutto di forma sferoidale di calibro medio-grosso (v.m. 7,4 gr.) rosso vinoso di buona resa in olio, nocciolo mediamente grande. **Produttività buona.** Varietà a duplice attitudine, olio e mensa, caratteristica per la maturazione molto tardiva e per una certa resistenza al freddo.

Varietà a Duplice Attitudine



Vaso
7x7

Vaso
13x13x18
12/18 mesi

Vaso
13x13x18
2 anni

Vaso
15x15x20
3 anni

Vaso 24

Vaso 28

Vaso 33

Vaso 45

Frutti antichi, resistenti alle malattie

I Frutti dimenticati sono una selezione accurata di specie e varietà che l'azienda APICE PIANTE ha collezionato in molti anni di recupero e valorizzazione del germoplasma locale.

Le varietà hanno in comune la **grande rusticità e resistenza alle malattie** difatti non necessitano di trattamenti antiparassitari e fruttificano in modo naturale senza grandi accorgimenti nella potatura e nell'allevamento.

I Frutti dimenticati sono longevi e molto ornamentali, **adatti per i giardini e i piccoli impianti familiari.**



Frutti di media dimensione rosso scuro, polpa dura e consistente dolce. Varietà autosterile, necessita di impollinatori come: Durone I o Bigarreau Burlat. **Maturazione inizio giugno.**



Frutti medi di colore rosso scuro brillante. Polpa succosa, dolce-acidula. Lenta messa a frutto, produttività media non costante. **Maturazione fine giugno.**



Vecchissima varietà molto apprezzata per la rusticità dell'albero. Frutti rosso scuro di medie dimensioni acidulo, adatto per confetture, sciroppi e liquori. **Maturazione metà giugno.**



Frutto rosso di medie dimensioni, polpa chiara, acidula, adatta per confetture, succhi e liquori. **Maturazione metà giugno.**



Frutti piccoli rosso intenso-neri, polpa rossa. Pianta di modeste dimensioni. Frutto adatto per la preparazione di succhi e liquori. **Maturazione fine giugno.**



I frutti sono in genere, rotondi-ellittici. Buccia va dal giallo pallido all'arancio brillante; il colore della polpa va dal crema all'arancio. **Maturazione da fine aprile a giugno.**



I frutti vanno consumati, ammezziti o cotti, un mese o due dopo la raccolta. **Maturazione ottobre.**

Frutti antichi, resistenti alle malattie

APICE PIANTE[®]

MICROPROPAGAZIONE E VIVAI DI QUALITÀ

la buona frutta



Susino "Sangue di Drago"

'Cino-giapponese', antica varietà con frutto piccolo, buccia verdastria, polpa rosso intenso da cui deriva il nome, gradevole. **Luglio.**

APICE PIANTE[®]

MICROPROPAGAZIONE E VIVAI DI QUALITÀ

la buona frutta



Susino "Coscia di Monaca"

Vecchissima varietà molto apprezzata per il sapore dolce e la rusticità dell'albero. Di dimensioni dal piccolo al medio e sovracoloro rosato. **Fine luglio-inizio agosto.**

APICE PIANTE[®]

MICROPROPAGAZIONE E VIVAI DI QUALITÀ

la buona frutta



Susino "Regina Claudia Verde"

'Europea', grossi frutti rotondi, giallo-verdastro. Polpa dolce e profumata. Luoghi soleggianti. **Maturazione inizio agosto.**

APICE PIANTE[®]

MICROPROPAGAZIONE E VIVAI DI QUALITÀ

la buona frutta



Susino "Regina Claudia Gialla tardiva"

Susino 'Europea' con grossi frutti rotondi, gialli. Polpa fine, succosa e molto dolce. Adatta per il consumo fresco e per confetture. Pianta estremamente rustica e longeva, lenta messa a frutto. **Maturazione metà agosto.**

APICE PIANTE[®]

MICROPROPAGAZIONE E VIVAI DI QUALITÀ

la buona frutta



Kaki "Cioccolatino"

Frutto piccolo, polpa dal giallo al marrone, "vanigliato", edule alla raccolta e dolce. Pianta piccola non necessita di alcun trattamento. **Maturazione ottobre.**

APICE PIANTE[®]

MICROPROPAGAZIONE E VIVAI DI QUALITÀ

la buona frutta



Percoco di Luglio

Buccia giallo-dorato, polpa molto consistente, tormentosa, nocciolo piccolo. Frutto medio adatto per consumo fresco e da sciroppare. **Maturazione metà luglio.**

APICE PIANTE[®]

MICROPROPAGAZIONE E VIVAI DI QUALITÀ

la buona frutta



Pesco bianco "Iris Rosso"

Frutti medi, di colore verde chiaro-biancastro con sovracoloro rosso sfumato. Polpa tenera, sensibile alle ammaccature, molto profumata. **Inizio luglio.**

APICE PIANTE[®]

MICROPROPAGAZIONE E VIVAI DI QUALITÀ

la buona frutta



Pesco bianco "Saturn" Platicarpa

Chiamata anche "pesca piatta" è molto apprezzata per il suo gusto e profumo, frutto piccolo. Varietà estremamente produttiva necessita di diradamento, consistente e resistente alla maturazione che avviene da inizio a metà agosto.

APICE PIANTE[®]

MICROPROPAGAZIONE E VIVAI DI QUALITÀ

la buona frutta



Pesco rosso "Della Vigna"

Frutto a polpa bianca fortemente venato di rosso. Buccia color rosso scuro vinoso. Profumata, resistente alle malattie. **Maturazione fine settembre.**

Frutti antichi, resistenti alle malattie

APICE PIANTE
MICROPROPAGAZIONE E VIVAIANO DI QUALITÀ
la buona frutta



Melo "Limoncella"

Frutto medio allungato molto profumato. Buccia gialla, polpa soda e dolce. Pianta piccola non necessita di trattamenti. **Maturazione inizio di ottobre.**

APICE PIANTE
MICROPROPAGAZIONE E VIVAIANO DI QUALITÀ
la buona frutta



Melo "Zitella-Gelata"

Varietà antica dell'Appennino centrale. Frutto medio-grande, buccia bianca rosata, polpa soda, aromatica, con tipiche caratteristiche vitrescenze da cui deriva il nome. **Maturazione metà ottobre.**

APICE PIANTE
MICROPROPAGAZIONE E VIVAIANO DI QUALITÀ
la buona frutta



Melo "Tinella-Dura-Ceretta"

Simile alla Piana, con buccia più verdastra e polpa più consistente. Si conserva ottimamente senza frigo tutto l'inverno. **Metà ottobre.**

APICE PIANTE
MICROPROPAGAZIONE E VIVAIANO DI QUALITÀ
la buona frutta



Melo ruggine

Antica varietà piemontese con buccia rugginosa tipica. Polpa bianca molto consistente e profumata, adatta per il consumo fresco e da cuocere. **Maturazione inizio ottobre.**

APICE PIANTE
MICROPROPAGAZIONE E VIVAIANO DI QUALITÀ
la buona frutta



Melo "Piana-Rosa"

Varietà antica dell'Appennino centrale, frutto schiacciato, medio piccolo, giallo con sovracoloro rosso se esposto al sole. Molto profumata, serbevole, resistente. **Maturazione metà ottobre.**

APICE PIANTE
MICROPROPAGAZIONE E VIVAIANO DI QUALITÀ
la buona frutta



Pero "Moscatella"

Frutti piccoli, giallo-verdastro. Polpa fondente, dolce e profumata, moscata. Adatta solo per consumo fresco. **Maturazione luglio.**

APICE PIANTE
MICROPROPAGAZIONE E VIVAIANO DI QUALITÀ
la buona frutta



Pero "Spadana"

Tipica varietà dell'Italia Centrale di medie dimensioni, produttiva con polpa tenera succosa e fondente. Non ammazzeisce a maturazione, adatta per consumo fresco e per succhi. **Maturazione inizio di agosto.**

APICE PIANTE
MICROPROPAGAZIONE E VIVAIANO DI QUALITÀ
la buona frutta



Pero "Butirra"

Frutti grossi, ovoidali, rugosi, verde-bronzo. Polpa bianca, dolce e fondente. Ottimo impollinatore. **Fine agosto-metà settembre.**

APICE PIANTE
MICROPROPAGAZIONE E VIVAIANO DI QUALITÀ
la buona frutta



Pero "Passa Crassana"

Frutto grossissimo conico, buccia verde, gialla alla maturazione, ruvida. Polpa bianca, fondente, gradevole e granulosa. Varietà rustica e resistente. Ottimo impollinatore. **Ottobre.**

Frutti antichi, resistenti alle malattie

APICE PIANTE
MICROPROPAGAZIONE E VIVAI DI QUALITÀ
la buona frutta



Cotogno periforme

Periforme, frutti enormi, allungati. Polpa di buona qualità. **Maturazione in ottobre.**

APICE PIANTE
MICROPROPAGAZIONE E VIVAI DI QUALITÀ
la buona frutta



Azzeruolo rosso

Alberello di non più di 3 metri d'altezza. Il frutto è un pomo globoso rosso fino a 4 cm nelle varietà coltivate. **Matura a fine agosto.**

APICE PIANTE
MICROPROPAGAZIONE E VIVAI DI QUALITÀ
la buona frutta



Sorbo domestico

Frutto periforme di 2/4 cm, di colore giallo-rossastro e punteggiato, bruno a maturità; la polpa è verdognola e dolce, con semi angolosi bruni. **I frutti maturano in autunno.**

APICE PIANTE
MICROPROPAGAZIONE E VIVAI DI QUALITÀ
la buona frutta



Corbezzolo

Frutti di 2 cm di colore rosso-porpora con superficie granulosa, hanno un sapore un po' acidulo e per questo vengono usati principalmente per la preparazione di marmellate. **Maturazione novembre-dicembre.**

APICE PIANTE
MICROPROPAGAZIONE E VIVAI DI QUALITÀ
la buona frutta



Giuggiolo a frutto grande

Frutti rosso-marroni della grossezza e forma delle olive o più secondo le varietà. La polpa è soda, un po' acidula, dolcissima a maturazione di colore verde tenue. **Maturazione settembre.**

APICE PIANTE
MICROPROPAGAZIONE E VIVAI DI QUALITÀ
la buona frutta



Carrubo

Pianta originaria del bacino meridionale del Mediterraneo. Il frutto (carruba) è un baccello allungato, appiattito e dolce.

APICE PIANTE
MICROPROPAGAZIONE E VIVAI DI QUALITÀ
la buona frutta



Gelso bianco

Frutti dolci, rosati. Usato come pianta da frutto ed ornamentale. L'uso era legato all'allevamento del baco da seta. **Maturazione giugno.**

APICE PIANTE
MICROPROPAGAZIONE E VIVAI DI QUALITÀ
la buona frutta



Gelso nero

Utilizzato per consumo fresco, marmellate, macedonia, dolci, grappe. La polpa viene usata in cosmetici. **Maturazione giugno.**

APICE PIANTE
MICROPROPAGAZIONE E VIVAI DI QUALITÀ
la buona frutta



Fico d'India

I frutti ovoidali e sono coperti di spine. Contengono una polpa succosa e ricca di piccoli semi, dal sapore dolciastrò. Vengono utilizzati anche per la preparazione di marmellate. **La maturazione avviene verso agosto-settembre.**

Frutti principali

PRODUZIONI

Possiamo programmare per VOI la produzione di piante a radice nuda, in pack o in vaso.

Il terriccio usato nella confezione aiuta l'attecchimento della pianta e la sua nutrizione nei primi mesi. Per garantirne l'attecchimento la pianta va trapiantata entro poche settimane.



Astons a radice nuda conservati in magazzino frigo

Piante in pack prodotte e confezionate in Italia



Bioterriccio

BIOTERRICCIO
CON CONCIMAZIONE A LENTO
RILASCIO, SOSTANZA
ORGANICA E PREZIOSI
MICROELEMENTI



Astons a radice nuda



Spedizioni in pochi giorni in Italia e in Europa



Imballo su pedane EPAL



Vaso 20

Vaso 24

Vaso 28

Frutti principali


Ciliegio *Prunus avium* (Rosaceae)

EN. Cherry tree FR. Cerise DE. Kirschbaum ES. Cerezo

Produttivo in tutte le regioni. Cresce su tutti i terreni eccetto argillosi e troppo umidi.

POTATURA: Va praticata tutti gli anni a fine inverno prima del germogliamento e si limita ad equilibrare la vegetazione e sfoltare il centro dell'albero. Evitare di eliminare i rami grossi. Si consiglia di effettuare anche una leggera potatura estiva a giugno eliminando esclusivamente i succhioni più vigorosi cresciuti nella parte alta ed interna dell'albero. Distanza di piantagione da 5x4 a 6x6.

IMPOLLINAZIONE: Le varietà di ciliegio non autofertili per fruttificare correttamente necessitano di varietà impollinatrici in prossimità.



Frutti rossi molto grossi, sopporta bene la pioggia. Polpa dolce. Peduncolo corto. Varietà vigorosa e molto produttiva. **Maturazione inizio maggio.**



Frutti molto grossi rosso intenso, brillanti. Polpa soda e dolce. **Maturazione inizio maggio.**



Precoce messa a frutto. Frutti consistenti, buona tenuta alla maturazione. Si adatta ai vari ambienti, sostituisce il durone I per la migliore pezzatura e produttività. **Maturazione metà maggio.**



Grossi frutti giallo rosato, sovracoloro rosso. Polpa soda, dolce e croccante. **Maturazione metà maggio.**



Frutti grandi duracini, resistenti allo spacco. Albero vigoroso, lenta messa a frutto. Produttività elevata su piante adulte. **Maturazione metà maggio.**



Rapida messa a frutto e buona produttività. Frutto molto grosso uniforme consistente. **Maturazione fine maggio.**



Rapida messa a frutto ed alta e costante produttività. Frutti molto grandi di media consistenza, dolci, di colore dal rosato al rosso chiaro. Adatto solo per l'autoconsumo e per i mercati locali. **Maturazione fine maggio.**



Frutti medi rosso-nero brillante. Consistente con polpa rossa scura. **Maturazione inizio giugno.**

Frutti principali



Frutti grandi, rosso intenso, brillanti. Peduncolo corto. Polpa soda e dolce. Varietà di riferimento, molto produttiva, valida impollinatrice per le altre varietà. **Maturazione inizio giugno.**



Frutti molto grossi un pò appuntiti, rosso brillante. Polpa croccante, dolce e succosa. Peduncolo lungo. Varietà di riferimento tra le più piantate. **Maturazione metà giugno.**



Frutti medi. Polpa soda rossa scuro. Lenta messa a frutto, produttività media non costante. **Maturazione fine giugno.**



Rapida messa a frutto e alta produttività. Frutto consistente rosso scuro, resistente. **Maturazione metà fine giugno.**



Frutti di grandi dimensioni, rosso brillante più scuri a maturazione. Polpa soda dolce-acidula e consistente. Buona produttività soprattutto su portinnesti poco vigorosi, adatta anche per impianti fitti. **Maturazione fine giugno.**



Rapida messa a frutto e alta produttività. Frutto molto grosso, uniforme, consistente, di colore rosso intenso, di buone caratteristiche. Sensibile allo spacco da pioggia. **Maturazione fine giugno.**

Ciliegie dolci:

	aprile			maggio			giugno			luglio			agosto		
Bigarreau Burlat				---											
Bigarreau Moreau				---											
Giorgia					---										
Bigarreau Napoleon					---										
Adriana					---										
New Star						---									
Sunburst						---									
Van							---								
Durone nero I							---								
Ferrovia								---							
Durone nero II / Durone III									---						
Lapins										---					
Regina											---				
Vittoria 'O'												---			

Frutti principali

Albicocco *Prunus armeniaca* (Rosaceae)

EN. Apricot tree FR. Abricotier DE. Aprikosenbaum ES. Albaricoquero

Ama il caldo, sopporta la siccità e teme le zone umide. Teme le gelate tardive. Nelle regioni fredde, piantarlo in esposizione soleggiata e riparata. Cresce su tutti i terreni, anche calcarei. Aspettare dai 2 ai 4 anni per una buona raccolta.

POTATURA: Fiorisce soprattutto sul legno di un anno. Va potato poco, per non favorire la gommosi nel periodo dicembre-febbraio. Eliminare totalmente i succhioni sviluppati sulla parte alta della chioma e i rami più grandi posti all'interno per favorire il soleggiamento dei frutti. Si consiglia di effettuare anche una leggera potatura estiva a giugno eliminando esclusivamente i succhioni più vigorosi cresciuti nella parte alta ed interna dell'albero.

IMPOLLINAZIONE: È autofertile nella maggior parte dei casi. Per le varietà più recenti si consiglia l'associazione con altre che fioriscono nella stessa epoca.

PIANTAGIONE: Sesto da 5x3 a 4x4. Le piante in vaso si possono trapiantare durante tutto l'anno, gli astoni a radice nuda si piantano da dicembre a fine febbraio. Non accorciare troppo le radici.



Frutti molto grandi di colore chiaro, giallo appena sfumato d'arancio. **Maturazione fine maggio-inizio giugno.**



Frutti medio-grossi, arancio chiaro. Polpa soda. **Maturazione inizio giugno.**



Frutti medi tondi, giallo arancione. Polpa succosa, dolce. **Maturazione inizio giugno.**



Frutti medio-grossi, arancio chiaro. Polpa poco soda. **Maturazione inizio giugno.**



Frutti grandi con buccia rossa attraente. **Maturazione seconda decade di giugno.**



Frutti medi, arancio intenso quasi rosso. Polpa soda. **Maturazione seconda decade di giugno.**

Frutti principali



Frutto molto grosso giallo arancio, polpa consistente e molto aromatica. **Maturazione fine giugno.**



Frutti medi, giallo pallido macchiati di rosso carminio. Eccellente per confettura e succhi di frutta. **Maturazione fine giugno.**



Frutti grossi, giallo-rosso. Polpa soda, dolce e saporita. **Maturazione a fine giugno.**



Ottima pezzatura e produttività, molto dolce, consistente. Forma allungata con sovracoloro rosso. **Maturazione prima decade di luglio.**



Frutti medio-piccoli, giallo oro. Polpa profumata e saporita adatta per confetture. **Maturazione prima decade di luglio.**



Frutti grossi, giallo intenso con sovracoloro rosso. Polpa consistente. **Maturazione inizio luglio.** Non produce sul ramo di un anno, adatto per il centro-sud.

	aprile		maggio		giugno		luglio		agosto	
Albicocche:										
Tyrinthos					-----					
Antonio Errani					-----					
Precoce di Imola					-----					
Brusa					-----					
Kioto					-----					
Cafona					-----					
Vitillo					-----					
San Castrese					-----					
Portici					-----					
Pellecchiella							-----			
Reale di Imola							-----			
Pisana							-----			

Frutti principali

Susino *Prunus domestica* (Rosaceae)

EN. Plum tree FR. Prunier DE. Pflaumenbaum ES. Ciruelo

Le varietà descritte derivano da specie diverse, per semplicità distingueremo le susine del tipo cino-giapponese dalle prugne del gruppo delle europee; le prime più sensibili alle gelate primaverili hanno frutti spesso di grandi dimensioni aromatici e succulenti, le seconde meno sensibili alle gelate per la fioritura tardiva sono più rustiche con frutti dolci e consistenti. Il susino si adatta bene su tutti i terreni, tollera anche quelli umidi senza ristagni.

POTATURA: Limitarsi ad una potatura molto leggera per conservare la forma e diradare il centro dell'albero. Parecchie varietà autosterili fruttificano solo con la presenza di altre impollinatrici dello stesso gruppo da piantare insieme per circa il 10%. Distanza di piantagione da 5x3 a 4x5 m.



'Cino-giapponese', frutti medio-piccoli, giallo-verde con sfumatura rosa. Polpa gialla. **Maturazione fine giugno-inizio luglio.**



'Cino-giapponese', grossi frutti rotondi, giallo. Polpa succosa. Si adatta a tutti i luoghi. **Maturazione fine giugno-prima decade di luglio.**



'Cino-giapponese', frutti medio-grandi, tondi, buccia nera, polpa chiara poco aromatica. Varietà molto produttiva necessita di sfoltimento nelle annate di carica. **Maturazione fine giugno.**



'Cino-giapponese', pianta molto vigorosa, usata spesso come impollinatrice. Frutti grossi, di color porpora scuro. Polpa sanguigna. **Maturazione seconda decade di luglio.**



'Cino-giapponese', frutti di forma tonda, di colore rosa violaceo. Polpa gialla abbastanza consistente e dolce. **Maturazione seconda decade di luglio.**



'Cino-giapponese', pezzatura elevata, produttività incostante soprattutto nelle zone fredde. Frutti di colore viola scuro-nero lucente. La polpa è ambrata molto soda, buona, zuccherina e gradevolmente acidula. **Maturazione metà luglio.**



'Europea', grossi frutti rotondi, gialli, sfumati di rosso. Polpa fine, succosa e dolce. **Maturazione fine luglio.**



'Cino-giapponese', varietà di costante ed elevata produttività. Frutti di colore rosso, alla maturazione violaceo. La polpa è gialla, molta soda, buona, zuccherina e gradevolmente acidula. **Maturazione fine luglio-inizio agosto.**

Frutti principali



'Cino-giapponese', varietà di costante ed elevata produttività. Frutti di colori viola scuro-nero lucente. La polpa è gialla, molta soda, buona, zuccherina e gradevolmente acidula. **Maturazione fine luglio-inizio agosto.**



'Cino-giapponese', frutto giallo, grande, ovoidale, con sfumature rosa. Polpa fine, gradevolmente acidula e dolce. **Maturazione metà agosto.**




'Europea', pianta rustica e produttiva, frutti medi, ovoidali, viola intenso. Polpa profumata molto soda. Autofertile e impollinatrice. **Maturazione metà agosto.**



'Europea', simile a Stanley, con frutti più grandi e polpa meno soda, dolce, ottima per il consumo fresco. **Maturazione terza decade di agosto.**



'Europea', frutti grossi o molto grossi, di colore viola-rossastro. La polpa è gialla, poco dolce e molto soda. **Maturazione seconda decade di agosto.**



'Cino-giapponese', grossi frutti ovoidali, viola intenso. Polpa succosa e dolce. Eccellenti da conservare in frigo. Luoghi riparati. **Maturazione fine agosto.**

	maggio		giugno		luglio		agosto		settembre	
Susine:										
Sorriso di primavera										
Shiro / Goccia d'oro										
Obilnaya										
Santa Rosa										
Ozark Premier										
Black Amber										
Regina Claudia gialla / Regina Claudia verde										
Fortune										
Friar										
Sungold 'O'										
Stanley										
Grossa di Felisio										
President										
Friar tardiva Angelino										

Frutti principali

Pesco *Prunus persica* (Rosaceae)

EN. Peach tree FR. Pêcher DE. Pfirsichbaum ES. Melocotonero

Il pesco è rustico, ma preferisce i climi temperati e caldi. Si adatta su tutti i terreni, eccetto quelli troppo umidi, asfittici. Teme gli eccessi del calcare salvo se è innestato su dei portainnesti adatti (susino, mandorlo, pescomandorlo, ecc...). Evitare di piantare un pesco su un terreno che ha già ospitato questa specie. Durata di vita: da 10 a 25 anni secondo le condizioni d'impianto.

POTATURA: Il pesco sopporta male la potatura, che provoca la secrezione di gomma. Va effettuata in febbraio-marzo, all'inizio della fioritura. I frutti si formano sui rami dell'anno precedente. Conviene conservare unicamente i giovani germogli mediamente vigorosi con angolo di inserzione largo.

DIRADAMENTO: Dopo la caduta naturale dei giovani frutti, conservare circa da 2 a 4 frutti per rametto (brindillo) ed eliminare tutti i giovani germogli che non portano frutti. Per un raccolto migliore, eliminare le foglie che nascondono i frutti.



Frutto medio-piccolo, buccia gialla, sovracoloro rosso brillante, sfumato e marezzato sull'80-90% della superficie. Polpa soda, di buon sapore. Maturazione inizio giugno.



Simile a Spring Crest ma leggermente più soda e produttiva. Maturazione fine giugno.



Frutti grossi, rosso arancione. Polpa succosa, dolce e profumata. Maturazione inizio agosto.



Frutti grossi, gialli, striati di rosso. Polpa soda, succosa e profumata. Maturazione fine agosto.



Frutti grossi, rosso intenso. Polpa soda molto profumata. Maturazione inizio luglio.



Ottima produttività, frutto molto grosso e colorato. Maturazione fine luglio.



Frutto grosso, sferico, giallo oro, macchiato di rosso. Polpa profumata di qualità eccellente. Ottima resistenza alle manipolazioni, spicca. Maturazione seconda decade di agosto.



Frutto grosso, striato di rosso. Polpa di sapore e profumo eccellente, spicca. Da piantare in collina soleggiata. Maturazione metà settembre.

Pesche a polpa gialla:

	giugno			luglio			agosto			settembre			ottobre		
Maycrest	---														
Spring Crest		---													
Springbelle* (cav)			---												
Flavorcrest				---											
Glohaven					---										
Suncrest							---								
Fayette								---							
Calred								---							
Fairtime										---					

Pesconoce o Nectarine *Prunus persica* (Rosaceae)

EN. Nectarine tree FR. Nektarine DE. Nektarine ES. Nectarina



PESCONOCE
MAY GRAN BIANCA

Frutti grandi a pasta bianca profumata. Molto produttiva. **Maturazione prima decade di luglio.**



PESCONOCE
FIREBRITE

Frutti medio-grossi, rossi. Polpa soda di color giallo screziata di rosso. **Maturazione inizio luglio.**



PESCONOCE
INDIPENDENCE

Frutti medi. Polpa saporita di color giallo venato di rosso. **Maturazione metà luglio.**



PESCONOCE
VENUS

Frutti di calibro grosso. Buccia gialla con sovracoloro rosso brillante. Polpa gialla, leggermente venata di rosso. Buon sapore. **Maturazione inizio agosto.**

PESCONOCE **FLAVORTOP**

Frutti grossi rossi e gialli. Polpa soda, gialla, rossa vicino al nocciolo. **Maturazione fine luglio.**



PESCONOCE
VEGA

Frutti grossi, gialli, venati di rosso. Polpa saporita. **Maturazione metà agosto.**



PESCONOCE
FAIRLANE

Buona la produttività, la pezzatura, la consistenza e le caratteristiche gustative. **Maturazione fine agosto-inizio settembre.**



PESCONOCE
STARK RED GOLD

Pianta vigorosa e molto produttiva. Frutti grossi, gialli con sovracoloro rosso. Polpa gialla, leggermente rossa intorno al nocciolo, consistente, di buon sapore. **Maturazione primi di agosto.**

PESCONOCE **FANTASIA**

Frutti medio-grossi di colore rosso e giallo. Polpa soda di colore giallo, rossa vicino al nocciolo. **Maturazione metà agosto.**

	giugno		luglio		agosto		settembre		ottobre	
Peschenoci o Nectarine:										
May Gran bianca			---							
Firebrite			---							
Indipendence			---							
Flavortop				---						
Stark red gold					---					
Venus					---					
Fantasia						---				
Vega						---				
Fairlane							---	---		

Frutti principali

Pesco Platicarpa *Prunus persica* (Rosaceae)

EN. Peach tree FR. Pêcher DE. Pfirsichbaum ES. Melocotón Platicarpa (Durazno)


Le nuove Platicarpa sono caratterizzate da dimensioni più grandi dell'originale "Saturn". Buccia di colore rosso più intenso ed estensione del calendario di maturazione. Queste pesche piatte hanno un sapore eccellente che le caratterizza, alta resistenza alle manipolazioni e tenuta sull'albero. Tutte le nuove selezioni sono più resistenti alle malattie, rispetto ai normali peschi e molto produttive.



Albero di vigoria medio-elevata ed ottima produttività; Il frutto ha pezzatura grossa, forma piatta, simmetrica, con apice incavato ma privo di spaccature; La polpa è di colore bianco, venata di rosso, molto soda. Il sapore è ottimo e profumato. **Maturazione da giugno a luglio.**



Frutto piatto e produttività elevata. Il frutto è grosso. La forma è piatta, simmetrica, con apice incavato e linea di sutura sporgente. La polpa è di colore bianco, soda, resistente alle manipolazioni. Il sapore è ottimo, dolce e profumato. **Maturazione luglio.**



Frutto di pezzatura grossa, a polpa gialla. La forma è piatta, leggermente asimmetrica, con apice incavato e linea di sutura leggermente sporgente. La polpa è gialla, molto soda, molto resistente alle manipolazioni. Il sapore è ottimo, dolce ed aromatico. **Maturazione fine giugno.**

Pesco a polpa bianca *Prunus persica* (Rosaceae)

EN. Peach tree FR. Pêcher DE. Pfirsichbaum ES. Melocotonero



Frutti grossi, di colore crema, con sovracoloro rosso. Polpa soda. **Maturazione metà luglio.**



Frutti grossi, rosso intenso. Polpa soda molto profumata. **Maturazione fine luglio.**



Frutti medio-grossi, rossi e bianchi. Polpa saporita e aromatica. **Maturazione metà agosto.**

Pesche a polpa bianca:

	giugno			luglio			agosto			settembre			ottobre		
Maria bianca					---										
Maria delizia						---									
Michelini							---								
Maria delizia 'O'								---							

Percoco o pesco da industria *Prunus persica* (Rosaceae)

EN. Hard peach tree FR. Pêche de vigne DE. Hartpfirsich ES. Percoca

Questo tipo di pesche viene utilizzato sia per la trasformazione (pesche sciropate, macedonia, marmellate, sciroppi) e sia per il consumo fresco soprattutto nel centro-sud.



Frutto di medio-grandi dimensioni, giallo ambra, polpa aromatica e consistente. **Maturazione a metà luglio.**



Frutti di eccezionali dimensioni, forma tondeggiante, polpa ottima. **Maturazione fine luglio.**



Gialla, appena sfumata di rosso, ottima da sciropare. **Maturazione metà agosto.**



Buona la produttività, la forma, la pezzatura e le caratteristiche organolettiche, sensibile alla cascola, ottima da sciropare. **Maturazione fine agosto-inizio settembre.**

Percoche o pesche da industria:

	giugno			luglio			agosto			settembre			ottobre		
Carson					---										
Baby gold 6						---									
Baby gold 7							---								
Andross							---								
Turi							---								
Baby gold 9								---	---						

Frutti principali

Melo *Malus Communis* (Rosaceae)

EN. Apple tree FR. Pommier DE. Apfelbaum ES. Manzano

Rustico, si adatta ai vari ambienti, anche montani. La pianta si presta ad essere allevata sia in volume: vaso, fusetto, colonna,...; e sia in forme appiattite: vari tipi di palmetta.

POTATURA: Varia a seconda dell'allevamento, in ogni caso si farà attenzione ad eliminare i succhioni situati nella zona alta della chioma, per permettere un buon sviluppo della vegetazione posta più in basso ed assicurare un giusto numero di gemme a fiore. Si consiglia di effettuare anche una leggera potatura estiva a giugno.

DISTANZA DI PIANTAGIONE: Da 5x3 a 4x4 per le forme in volume, da 4x1 a 5x3 per le forme appiattite. La fioritura è tardiva, è bene piantare più varietà per migliorare la produttività.

IMPOLLINAZIONE: Le migliori varietà impollinatrici sono: 'Golden Delicious' e 'Starking'.



Forma allungata e di grandi dimensioni, frutti rossi su fondo giallo. Polpa color crema, succosa, gusto tipicamente dolce, croccante, non farinosa. Eccellente conservazione. Necessita di pochi trattamenti. **Maturazione fine luglio.**



Vigorosa, grossi frutti allungati, rosso violaceo opaco poi brillante, polpa soda, consistente e succosa, farinosa a sovraturazione. **Maturazione inizio settembre.**



Frutti grossi, leggermente conici, giallo oro. Polpa fine, profumata, dolce, di buon sapore. Certamente la più coltivata. **Maturazione metà settembre.**



Frutti grossi, appiattiti, rugosi, giallo-verdastro. Polpa soda, molto profumata, succosa e leggermente acidula. Utilizzata anche per la preparazione di dolci. **Inizio ottobre.**

Frutti principali



**MELO
FUJI**

Originaria dal Giappone, forma tondeggianti, buccia rosso chiaro tipicamente striata, su fondo giallo. Polpa bianca croccante e succosa, sapore estremamente dolce e aromatico. Si conserva facilmente, necessita di pochi trattamenti. **Metà ottobre.**



**MELO
ANNURCA**

Frutti medi sferoidali, appiattiti, giallo-verde, striati di rosso. Polpa bianca, dolce e leggermente acidula. Necessita di pochi trattamenti. **Maturazione a metà ottobre.**



**MELO
GRANNY SMITH**

Grossi frutti rotondi, leggermente appiattiti, verde chiaro brillante. Polpa color ghiaccio, acidula, croccante e profumata. Conservazione molto buona. **Maturazione metà ottobre.**



**MELO
IMPERATORE**

Di forma sferoidale o un pò appiattita. Frutti grossi, gialli e rossi. Polpa bianchissima, poco profumata, succosa e un po' acidula. **Inizio ottobre.**

Mele:

	luglio			agosto			settembre			ottobre			novembre		
Gala estiva			---												
Starking							---								
Golden B							---								
Renetta del Canada										---					
Imperatore										---					
Fuji										---					
Annurca										---					
Granny Smith											---				

Frutti principali

Pero *Pirus communis* (Rosaceae)

EN. Pear tree FR. Poirier DE. Birnbaum ES. Peral

Rustico, teme i terreni sabbiosi, molto argillosi e calcarei se innestato su cotogno. Abbastanza esigente, preferisce una terra fresca, profonda, permeabile e ricca. Teme la siccità e i venti violenti. La distanza di piantagione varia secondo la forma degli alberi. Stesse indicazioni del melo per sesti di impianto e potatura.

IMPOLLINAZIONE: Anche se certe varietà sono autofertili (Guyot, Conference), il pero necessita la piantagione di almeno due varietà per fruttificare bene. Le migliori varietà impollinatrici sono: 'Butirra Hardy', 'Decana del comizio', 'Passa Crassana', 'Kaiser' e 'William'.

FRUTTIFICAZIONE-RACCOLTA: Per ottenere bei frutti, bisogna praticare il diradamento a giugno, conservando solamente una o due pere posizionate all'esterno del corimbo. I frutti ottenuti saranno più grossi.



Ha un piccolo frutto piriforme allungato, molto buono e attraente. La buccia è gialla, macchiata di rosso, e la polpa è bianca, consistente e saporita. **Matura nell'ultima decade di giugno.**



Varietà estiva, abbastanza succosa e caratterizzata da elevata produttività e precoce fruttificazione. Per queste interessanti peculiarità la sua coltivazione riscuote un buon interesse nell'Italia centro-meridionale. **Maturazione fine luglio.**



La pezzatura è medio-piccola, sui 100-180 grammi, di colore verde chiaro, ha un sapore molto dolce, polpa finissima. Molto apprezzata e conosciuta. **Maturazione terza decade di luglio.**



Frutti grossi, giallo-dorato, punteggiati di rosso. Polpa fondente, succosa, dolce e profumata. **Maturazione inizio agosto.**



Frutti piccoli, giallo-verdastro. Polpa fondente, dolce e profumata. Adatta solo per consumo fresco. **Maturazione metà luglio.**



Uguale alla precedente, con buccia rosso intenso, meno serbevole. **Maturazione inizio agosto.**

Frutti principali



Varietà molto apprezzata e conosciuta per il suo caratteristico lungo "collo". Bucci verde-giallastra. Polpa molto succosa, acidula e gradevole. **Maturazione inizio settembre.**



Grossi frutti allungati, giallo-verdastro-arancio. Polpa profumata e succosa. Per conservarla in frigo va raccolta a fine settembre prima della **maturazione a ottobre.**



Frutto grosso, allungato. Polpa bianco-giallastra, fine e succosa, buon sapore, zuccherina. La buccia, ruvida e profumata, caratterizzata dal color ruggine su sottofondo giallo-bronzeo. **Maturazione ottobre.** Raccogliere in settembre prima della maturazione.



Forma tozza, frutti molto grossi, giallo-vermiglione, macchiati di bruno. Polpa fine, squisita. Una delle migliori varietà. **Maturazione fine ottobre.** Raccogliere in settembre prima della maturazione.

	giugno			luglio			agosto			settembre			ottobre			novembre		
Pere:																		
Bella di giugno			----															
Precoce Morettini				----														
Coscia					----													
Santa Maria					----													
William bianco							----											
William rosso							----											
Abate Fetel										----								
Conference												----						
Kaiser															----			
Decana del comizio															----			

Frutti principali



Fico *Ficus carica* L. (Moraceae)

EN. Fig tree FR. Figuier DE. Feigenbaum ES. Higuera

La coltura del FICO è estremamente interessante ed attuale. Il frutto, molto richiesto dal mercato, ha prezzi elevati. La pianta, tipicamente mediterranea, si adatta ai climi asciutti ed ai terreni collinari, anche poveri e non irrigui. Non sono necessari trattamenti antiparassitari, il frutto quindi è 'biologico'.

POTATURA: È semplice, non si effettua il diradamento dei frutti.

DISTANZA: Sesto di impianto da 4x4 a 5x5. Nella maggior parte dei casi si hanno due produzioni: i primi frutti detti FIORONI i secondi chiamati FORNITI o FICHI VERI.



Albero di medio vigore, portamento aperto, foglie pentalobate 30% trilobate 40% intere 30%. Produzione dal 12/06 al 3/07 di fioroni MOLTO GRANDI 160/180 gr. di forma oblata, buccia di color viola marrone, polpa color ambra dolce succosa di scarsa resistenza alle manipolazioni. Fichi medio grandi, di ottimo sapore.



Albero di media vigoria, portamento aperto, foglie trilobate 40%, pentalobate 60%. Produzione di fioroni dal 05/07 al 25/07 e di forniti dal 20/08 al 30/09. I fioroni hanno forma conica o piriforme tendente al cucurbitiforme collo pronunciato ed ostiolo chiuso, peso medio 70 gr. buccia sottile totalmente nera, polpa rosa ambrato consistente, resistente alle manipolazioni. I forniti hanno forma leggermente più corta dei fioroni, buccia nera, sottile, polpa rossa, peso medio di 65 gr. La produzione dei forniti è circa il doppio di quello dei fioroni. Produttiva e consistente, è la varietà a buccia nera più interessante per il mercato.



Albero poco vigoroso, portamento espanso, foglie intere trilobate e pentalobate piuttosto piccole. Produce solo forniti dal 25/09 fino ai primi freddi, forma ampolliforme con apice piatto e ostiolo ampio, collo corto ben definito. Polpa di color rosso intenso di media consistenza aromatica e poco succosa, buccia nero violacea, buona resistenza alle manipolazioni. Peso medio 55 gr.



Albero di media vigoria, foglie trilobate 60% e intere 40% seni interlobari poco profondi. I fioroni maturano dal 30/06 al 15/07, hanno forma conica, collo lungo, ostiolo chiuso peso medio 90/100 gr. buccia rosso vinoso o violacea polpa rosa chiaro succosa mediamente soda molto fine da cui deriva il nome. I forniti maturano dal 20/08 al 20/10 sono simili ai fioroni peso medio 65 gr. Ottima resistenza alle manipolazioni, adatta per il consumo locale.



Albero di medio/alta vigoria con portamento assurgente, foglie pentalobate con lobi stretti e seni molto pronunciati. Produzione di soli forniti dal 25/09 fino alle prime gelate invernali anche dopo la caduta delle foglie. I forniti di forma conica cucurbitiforme con collo molto lungo e peduncolo legnoso hanno peso 50/70 gr., buccia molto sottile di colore rosso vinoso ad inizio maturazione, verde rossastro a fine, polpa consistente rossa molto resistente alle manipolazioni. È molto interessante per la serbevolezza e l'epoca estremamente tardiva di maturazione.



Frutti principali



Albero di media grandezza e vigoria, portamento espanso, foglie pentalobate 40%, trilobate 50%, intere 10% lobi larghi e seni stretti poco pronunciati. Produzione di fioroni DI GRANDI DIMENSIONI dal 10/06 al 30/06, buccia di colore verde giallastro, forma turbinata a trottola, polpa ambrata dolce mediamente succosa. Forniti grandi 120/140 gr. resistenti alle manipolazioni. Produttività elevata.



Albero di media grandezza ed elevata vigoria con rami assurgenti lunghi, foglie pentalobate 40%, trilobate 50% intere 10%. Produzione di soli fioroni dal 15/06 al 5/07, buccia di colore verde intenso a maturazione tendente al bianco, forma globosa piriforme o a trottola, polpa da rosato ad ambrato succosa dolce, collo medio, peduncolo corto aderente al ramo. Fiorone grande 100/110 gr resistente alle manipolazioni con raccolta abbondante e concentrata. Produce i fichi veri solo se impollinati.



Albero grande di media vigoria portamento aperto con foglie intere trilobate e pentalobate con seni interlobari poco profondi. La produzione di fioroni dal 28/06 al 15/07 è scarsa e presente soprattutto nelle annate con inverni miti. Il fiorone 65 gr ha forma piriforme o ovoidale, buccia verde giallastro, ostiolo aperto, polpa rosa sfumata di viola consistente ed aromatica. I forniti maturano dal 15/08 al 25/09, peso medio 60 gr con forma a trottola o ovoidale ostiolo semiaperto con brattee aperte, buccia giallo verdastro polpa ambrato chiaro o rosa succosa con consistenza molle aromatica, sapore dolce mielato molto apprezzato dai consumatori. Varietà adatta all'essiccazione.



Albero medio vigoroso. Doppia produzione di fioroni di grandi dimensioni e fico vero di pezzatura inferiore. Polpa dolce e scura adatta alle manipolazioni.



Albero di scarso vigore a portamento compatto con foglie piccole trilobate e pentalobate, con seni interlobari poco pronunciati ad angolo arrotondato. Produce solo forniti dal 20/08 al 15/10 ed oltre, peso medio di 90 gr. forma ampolliforme schiacciata con ostiolo medio e polpa molto consistente rosa intenso aromatica molto dolce, buccia verde intenso tendente al giallastro, pruinosa. Buona produttività, molto resistente alle manipolazioni, adatto per il consumo fresco e l'essiccazione, interessante per la forma tipica e la consistenza.



Albero poco vigoroso a portamento espanso, chioma di medie dimensioni, foglie 90% trilobate, 10% intere. Produce solo forniti dal 10/09 al 30/10 ed oltre di forma ovoidale o a trottola allungata con apice appiattito leggermente depresso e collo ben pronunciato, buccia di color verde scuro giallastro, ricettacolo mediospesso, polpa rossa soda poco aromatica e poco succosa. Peso medio 80/100 gr., ottima produttività ed elevata resistenza alle manipolazioni. Si presta all'essiccazione, molto interessante per l'epoca di maturazione tardiva e la dimensione dei frutti.

	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre
Fichi:						
Fillacciano CL 158						
Cerreto CL 32 *						
Bordeaux de Lyon *						
Turca CL 162						
Tauro CL 25 *						
Paradiso CL 24 *						
Della signora CL 20						
Panino CL 29 *						
Dottato CL 157						
Palazzo CL 23 *						
Brogiotto CL 161						
Verdone CL 160						

Frutti principali



Kaki *Diospyros* (Rosaceae)

EN. Persimmon tree FR. Kaki DE. Kakibaum ES. Caqui

È anche un albero d'ornamento. I frutti arancioni restano molto tempo sui rami. La raccolta si effettua da metà ottobre a inizio novembre. Poco esigente sulla natura del terreno e sull'esposizione, preferisce i luoghi riparati nelle zone settentrionali. I giovani alberi temono le forti gelate.



Astringente alla raccolta, i frutti vanno consumati ammezzati, circa un mese dopo, morbidi e dolci. **Maturazione inizio ottobre.**

Dolce, non astringente alla raccolta se impollinato, viene consumato duro. **Maturazione fine settembre, inizio ottobre.**

Astringente alla raccolta, i frutti vanno consumati ammezzati, di colore rosso intenso, più consistenti del kaki Tipo. **Maturazione inizio ottobre.**


Frutto piatto di piccole dimensioni. Astringente alla raccolta, i frutti vanno consumati ammezzati, più consistenti del kaki Tipo. **Maturazione inizio ottobre.**

	luglio			agosto			settembre			ottobre			novembre		
Kaki:															
Tipo - Loto di Romagna															
Vaniglia															
Hana Fuji															
Royo Brillante															
Sharon															

Pero Nashi *Pirus pyrifolia* (Rosaceae)

EN. Pear tree FR. Poirier DE. Birnbaum ES. Peral Nashi

Simile ad un mela, ha la polpa croccante di una pera molto dolce; lunga conservazione. Adatto al clima temperato, sopporta i terreni leggermente calcarei. Rustico e vigoroso, non supera 3 m di altezza. Per ottenere dei frutti di calibro superiore, diradare in maggio, mentre la raccolta si effettua da agosto a settembre. Conservando solo un frutto a mazzo, si ottengono dei frutti da 6 a 7 cm di diametro. Varietà a frutti gialli, lisci, bruno chiaro, e rugosi.



Pero asiatico con buccia marrone e polpa bianca fondevole dolce e aromatica. Produttività elevata e costante, autofertile, necessita di sfoltitura dei frutti per una buona pezzatura. **Maturazione inizio agosto.**

Pero asiatico con buccia marrone e polpa bianca fine e croccante, dolce e aromatica. Produttività elevata e costante, autofertile, necessita di sfoltitura dei frutti per una buona pezzatura. **Maturazione metà-fine agosto.**

Pero asiatico con buccia gialla detto anche peromela. Polpa bianca fine e croccante. Produttività elevata e costante, autofertile, necessita di sfoltitura dei frutti per una buona pezzatura. **Maturazione metà-fine agosto.**

Kiwi *Actinidia deliciosa* (Actinidiaceae)

DESCRIZIONE: Pianta rampicante sarmentosa molto vigorosa e ornamentale, necessita di sostegni per la coltivazione a spalliera o a pergola. Pianta dioica con individui femminili pistilliferi e maschili staminiferi. Piantare 1 pianta maschile e 3-6 piante femminili. Il frutto è molto ricco di vitamina C. Raccolta fine ottobre-inizio novembre.

IMPIANTO: Può essere coltivata in tutta Italia ma teme la siccità, predilige terreni sciolti, profondi ben drenanti e ricchi di sostanza organica. Richiede frequenti innaffiature. Distanza di piantagione da 2,5x4 a 4x4 mt.

COLTIVAZIONE: Coltura rustica, richiede poche cure, concimazione minerale equilibrata con prevalenza di azoto in primavera e concimazione organica in autunno inoltrato, su terreni calcarei aggiungere ferro sequestrante.

POTATURA: Alla piantagione lasciare 2 o 3 gemme per ramo; gli anni seguenti, conservare da 6 a 8 rami con 5-8 gemme ognuno ed eliminare i rami che hanno prodotto. Potare durante l'inverno.

TRATTAMENTI: In ambienti asciutti e per coltivazioni hobbistiche non sono necessari trattamenti anticrittogamici.

Cultivar:

Hayward cv femminile: Frutti di grandi dimensioni 90-120 gr, tomentosi di color verde chiaro all'interno, pianta molto produttiva, di lenta entrata in fruttificazione. Raccolta da inizio a fine novembre, si conserva facilmente per tutto l'inverno.

Tomuri cv maschile: Pianta maschile impollinatrice.


Arguta cvs: Frutto piccolo a buccia verde, sottile, privo di tomentosità, può essere mangiato con tutta la buccia. Si raccoglie da fine settembre a tutto ottobre.



Kiwi in vaso



Nuova varietà con frutti tomentosi più piccoli di Hayward, non necessita di pianta maschile.



Frutti di grandi dimensioni 90-120 gr, tomentosi di color verde chiaro all'interno, pianta molto produttiva, di lenta entrata in fruttificazione. Raccolta da inizio a fine novembre, si conserva facilmente per tutto l'inverno.



Actinidia arguta 'Issai' (autofertile): frutto di media pezzatura (50-80 grammi), con buccia sottile di colore verde-rossiccio, liscia e priva di peluria (può anche essere mangiata). La polpa è di colore verde brillante, di sapore molto dolce.

La maturazione è precoce e avviene 2/3 settimane prima di 'Hayward'. Essendo una varietà autofertile, per fruttificare non richiede impollinatori. Cultivar molto rustica, chiamata anche "mini-kiwi" per via del suo sviluppo, molto più limitato rispetto all'actinidia tradizionale.



Stesse caratteristiche di Hayward ma con polpa gialla dolce.

Frutta secca

Noce *Juglans regia* (Juglandaceae)

EN. Walnut FR. Noyer DE. Walnussbaum ES. Nogal

Albero rustico a grande sviluppo. **IMPOLLINAZIONE:** necessita di almeno due piante, tranne per le noci innestate autofertili.



Frutto piccolo, molto saporito, legno molto adatto per realizzare mobili.



Una delle varietà più famose e piantate del mondo. Molto produttiva, fioritura medio tardiva anche sui rami laterali, autofertile. Gheriglio chiaro carnoso di buon sapore. Albero a portamento espanso.

NOCE FERNOR

Frutto grande e tondeggiante, a guscio tenero, ottimo sapore e conservabilità.

NOCE LARA

Noce di grossa pezzatura con forma tipica a fondo piatto. Frutto di ottimo sapore molto ricco di grassi utili all'organismo. Fioritura tardiva anche su rami laterali.



Noce di origine francese a portamento espanso. Fioritura e maturazione tardive, parzialmente autofertile. Gheriglio carnoso di ottimo sapore.

Castagno

Castanea sativa (Fagaceae)

EN. Chestnut FR. Châtaigne DE. Kastanienbaum ES. Castaño

Albero di grande sviluppo (20 a 25 m). Richiede suoli leggeri, teme l'eccesso di umidità e il calcare.

IMPOLLINAZIONE: necessita di almeno due piante, soprattutto se da seme.



Grossi frutti rotondi. Polpa soda di qualità molto buona. Inizio ottobre.



A frutto molto grandi di media qualità resistenti al mal dell'inchostro. Resistente al cinipide.

Nocciolo *Corylus avellana* (Betulaceae)

EN. Hazel FR. Noisette DE. Haselnussstrauch ES. Avellano

Molto rustico per tutti i climi e per i terreni anche calcarei purché drenanti. Distanza di piantagione da 4 a 5 m.

IMPOLLINAZIONE: Il nocciolo è monoico: ci sono fiori maschili (polline) e fiori femminili (nocciole) sulla stessa pianta; sono portate sui rami dell'anno precedente e fioriscono generalmente con uno sfasamento da qualche giorno a qualche settimana fra i 2 tipi di fiori. Dunque bisogna assicurare una buona impollinazione con la piantagione di varietà diverse e compatibili.

NOCCIOLO TONDA GENTILE DELLE LANGHE

Frutti sferici dal guscio sottile. Molto produttiva. **Maturazione precoce.**

NOCCIOLO TONDA GENTILE ROMANA

Frutti sferici leggermente striati. **Maturazione media a inizio settembre.**

NOCCIOLO TONDA DI GIFFONI

Frutto solcato nel suo centro. Buona produttività. **Inizio settembre.**

NOCCIOLO NOCCHIONE

Buona vigoria e produttività. Frutto sferoidale di media dimensione. **Maturazione intermedia.**



Pistacchio

Pistacia vera L. (Anacardiaceae)

EN. Pistachio FR. Pistache DE. Pistazie ES. Pistacho

Albero longevo originario del medio oriente in cui è ancora molto coltivato. Pianta dioica con fiori maschili e femminili presenti su piante diverse, di solito una pianta maschile può impollinare fino a dieci piante femminili.

IMPOLLINAZIONE: produce solo su piante femminili impollinate da piante maschili.



Frutta secca

Mandorlo *Amygdalus communis* (Rosaceae)

EN. Almond FR. Amandier DE. Mandelbaum ES. Almendro

Adatto ai climi temperati e caldi; teme le gelate sebbene le migliori varietà fioriscono più tardi delle vecchie cultivar. Richiede dei terreni asciutti e calcarei.

IMPOLLINAZIONE: Piantare 2 varietà vicine per ottenere una buona fruttificazione.



Autofertile, fioritura medio-tardiva, molto produttivo. Frutti medi dalla forma sferoidale. Guscio semi-duro. **Fine agosto.** Resa 35-40%.



Guscio medio. Tardivo, produttivo. **Seconda decade di settembre.** Fioritura tardiva resa 30-35%



Molto produttivo; frutti cilindrici, di colore marrone, duri. **Inizio settembre.** Fioritura tardiva, resa 40-45%.



Molto produttivo; frutti cilindrici, di colore marrone, duri. **Inizio settembre.**



Guscio semitenero. Tardivo, produttivo, autofertile. **Inizio settembre.**

Piante nane ornamentali

Albicocco nano

Frutti medi, gialli, dolci. Adatto alla coltivazione in vaso. **Maturazione a giugno.**

Ciliegio nano

Fiorisce in primavera abbondantemente, pianta molto ornamentale con fruttini neri piccoli. Ideale per vaso. **Maturazione in giugno.**

Fico nano

Crescita molto lenta, adatto alla coltivazione in vaso. **Maturazione in settembre.**

Mandorlo nano

Adatto alla coltivazione in vaso, di crescita molto lenta. Bella la fioritura e il fogliame ornamentale elegante. **Maturazione in settembre.**

Melo nano

Frutti medi, rosati, dolci. Adatto alla coltivazione in vaso h 200 cm. **Maturazione a settembre.**

Pero nano

Crescita molto lenta, adatto alla coltivazione in vaso. **Maturazione in ottobre.**

Percoco nano

Crescita lenta ed internodi corti. Abbondante fioritura e fruttificazione. **Maturazione in agosto.**

Pesco nano

Adatto alla coltivazione in vaso, di crescita molto lenta. Bella la fioritura e il fogliame ornamentale elegante. **Maturazione fine luglio inizio agosto.**

Pesconoce nano

Adatto alla coltivazione in vaso, di crescita molto lenta. Bella la fioritura e il fogliame ornamentale elegante. **Maturazione fine luglio inizio agosto.**

Susino nano

Portamento nano, adatto per piccoli spazi e terrazzi. **Maturazione in luglio.**



Pesco - Pesconoce - Pero - Melo - Albicocco - Ciliegio - Mandorlo - Fico



Albicocco nano



Ciliegio nano



Melo nano



Pero nano



Pesco nano



Pesconoce nano

Piante nane:

	giugno			luglio			agosto			settembre			ottobre		
Albicocco nano			----												
Ciliegio nano	----														
Fico nano										-----					
Mandorlo nano										-----					
Melo nano										-----					
Pero nano													-----		
Percoco nano							-----								
Pesco nano					-----										
Pesconoce nano					-----										
Susino nano				-----											


Uve da tavola *Vitis vinifera* L. (Vitaceae)

EN. Grape FR. Raisiner DE. Trauben Pflanzen ES. Viña

Pianta sarmentosa rampicante, generalmente viene allevata su filari o pergole con distanza di impianto di 200-250 cm sulla fila e 220-250 cm tra le file. Necessita di cure attente per la potatura invernale ed estiva con sfemminellature e selezione dei grappoli. Si effettuano trattamenti anticrittogamici a base di rame e zolfo dalla ripresa vegetativa con germogli di almeno 10 cm fino a fine luglio.



Buccia rosata tipica; grappolo grosso, allungato; acino grosso; polpa croccante e gradevole. **Luglio.**



Buccia nera; grappolo grosso, allungato; acino lungo; polpa croccante e gradevole. **Luglio.**



Giallo ambra, grappoli di media grandezza, polpa dolce. **Inizio agosto.**

UVA SENZA SEMI

Ideale per i bambini, bianca, acini tondeggianti di buon sapore. **Maturazione inizio agosto.**

UVA MOSCATO D'AMBURGO


Grappoli grossi e compatti, acini neri e succosi. **Maturazione inizio ottobre.**

UVA MICHELE PALIERI


Nera, acino grosso, ovale, con buccia di medio spessore, polpa croccante, soda, dolce. **Fine agosto.**



Bianca, rappresenta una delle uve più diffuse, molto produttiva, grappolo lungo, acino lungo, buccia fine, polpa croccante e dolce. **Metà agosto.**




Acino molto allungato, appuntito, ricurvo; polpa croccante e dolcissima. **Terza decade agosto.**




Acino molto allungato, appuntito, ricurvo; polpa croccante e dolcissima. **Terza decade agosto.**



Bianca, grappolo grosso, acini grandi e uniformi, sapore neutro, polpa croccante.



Nera, acino sferico, polpa consistente e poco dolce. **Fine agosto.**



Grappoli grossi e compatti, acini dorati e succosi. **Maturazione inizio ottobre.**



Grossi acini, polpa croccante e succosa, sapore moscato, buccia spessa; ottima conservabilità. **Settembre.**



Grossi acini, polpa croccante e succosa, sapore moscato, buccia spessa; ottima conservabilità. **Settembre.**

Uve da tavola resistenti alle malattie *Vitis vinifera L.* (Vitaceae)

Varietà resistenti alle malattie fungine ed alla fillossera, non necessitano di trattamenti antiparassitari, rustiche e facili da coltivare sono ideali per le piccole pergole familiari, per gazebi e spalliere verdi. Si dividono in due gruppi: Fragola dal tipico sapore e profumo da cui deriva il nome e Francese, ibridi produttori diretti resistenti e con foglia glabra e bella vegetazione.



Produttore diretto resistente alle malattie con acino grande a buccia nera e buona produttività. **Maturazione fine agosto.**



Produttore diretto resistente, bel grappolo con acini allungati simile al pizutello. Buccia bianca, sapore ottimo. **Maturazione inizio settembre.**



Produttore diretto resistente a fillossera non necessita di innesto su americano, foglia glabra, grappolo medio-grande, produttiva varietà classica con acino medio, buccia fine, gradevole sapore della polpa adatta per consumo fresco e come pianta ornamentale. **Maturazione settembre.**



Foglie con la tipica tomentosità della pagina inferiore, acino medio tondeggiante, polpa molle dall'inconfondibile profumo da cui deriva il nome, utilizzata per il consumo fresco, per confetture e per la produzione del tipico "vino" detto "fragolino". **Maturazione fine agosto.**



Simile a fragola nera da cui si distingue per il colore dell'acino e per la minore pezzatura del grappolo. **Maturazione agosto.**



Vaso 15x15x20
It 3,5 h 180 cm

Uve da vino *Vitis vinifera L.* (Vitaceae)

Disponiamo di barbatelle innestate di un anno a radice nuda e di piante allevate in vaso per rimpiazzi delle principali varietà sia nazionali che locali a buccia bianca e nera. Particolare attenzione dovrà essere riservata alla scelta del portinnesto in base al tipo di terreno, alla varietà ed alla forma di allevamento.

Varietà principali bianche: Trebbiano Toscano, Incrocio Fedit F51, Chardonnay, Pinot Grigio, Moscato, Malvasia di Candia.

Varietà locali bianche: Pecorino, Passerina, Cococciola, Trebbiano Abruzzese.

Varietà principali nere: Sangiovese, Merlot, Primitivo, Negroamaro.

Varietà locali nere: Montepulciano.

Principali portinnesti: Kober 5BB, SO4, Paulsen 1103, 775P, 779P, 140 RU, 420A, 110R

Agrumi

Arancio *Citrus sinensis* (Rutaceae) - **Kumquat** *Fortunella margarita* (*kumquat nagami*) (Rutaceae) - **Limone** *Citrus limon* (Rutaceae)
Mandarancio *Citrus clementina* (Rutaceae) - **Mandarino** *Citrus reticulata* (Rutaceae) - **Pompelmo** *Citrus paradisi* (Rutaceae)
Cedro *Citrus medica* (Rutaceae) - **Bergamotto** *Citrus Bergamia Risso* (Rutaceae) - **Mapo** *Citrus x tangelo* (Rutaceae)

Questi alberi non possono essere coltivati in piena terra fuori dalle zone a clima temperato e mite. Però, si adattano particolarmente alla coltivazione in fioriere. Sono eccellenti piante ornamentali grazie al bel fogliame persistente, verde intenso lucido e opaco sotto. Di crescita lenta, necessitano di poca potatura per eliminare i rami mal disposti. Per la piantagione in fioriere, preparare un miscuglio composto da 1/3 terra da giardino, 1/3 torba e 1/3 di terriccio che, su un letto di ghiaia sul fondo della fioriera, assicurerà il drenaggio. Nel periodo della vegetazione, occorre innaffiare. Due volte al mese, l'apporto di un concime appropriato sarà sufficiente. Durante la bella stagione, l'esposizione riparata mezza soleggiata è la migliore, evitare l'ombra permanente. In inverno, le piante dovranno soggiornare in un locale luminoso, al riparo dal gelo, ma senza temperatura eccessiva (15°C al massimo). Una leggera innaffiatura due volte al mese sarà sufficiente.



Albero vigoroso, abbastanza rustico, sopporta temperature fino a -5°C. Le foglie, persistenti, di colore verde pallido, sono allungate. Frutto di colore giallo, ovali, buccia butterata. La polpa ha un sapore aspro. Fioritura bianca e viola porpora, profumata, rifiorisce regolarmente; la maturità dei frutti è scaglionata su una parte dell'anno. Tra le principali varietà ricordiamo: Lunario Quattro stagioni, Amalfitano, Femminello.



Portamento compatto. Resiste al freddo fino a -7°C. Grossi frutti arancioni con buccia spessa e tipico sapore dolce ancor prima della maturazione. Fioritura bianca profumata in primavera, maturità dei frutti a fine autunno.



Resiste al freddo fino a -5°C. Vegetazione compatta. I frutti sono piccole arance che maturano in autunno. La buccia è molto sottile e la loro polpa è molto succosa. Fioritura bianca profumata in primavera. Molto simile al Mandarino, ma i frutti non hanno semi.



Arance con forma globosa e buccia sceszata di rosso, polpa con venature di rosso ad alta resa in succo e ricco di vitamina C. Maturazione tardiva febbraio-marzo.



Portamento compatto. Resiste al freddo fino a -7°C. Grossi frutti con buccia sottile color arancio. Esperidio succoso, dolce, molto dissetante. Fioritura bianca profumata in primavera, maturità dei frutti a fine autunno.



Portamento compatto. Resiste al freddo fino a -5°C. Le foglie sono ovato-oblunghe e ovato-lanceolate. I frutti, di media grandezza, sono arancioni. Buccia profumata, sottile, poco aderente alla polpa che è gialla, succosa e dolce. Fioritura profumata in primavera, frutti a fine autunno.



Viene chiamato anche arancino cinese o mandarino del Giappone. Portamento compatto, buona resistenza al freddo (-12°C). Piccoli frutti ovali, giallo arancione a partire da dicembre. Fioritura profumata, prolungata, a maggio. I frutti leggermente amari sono eccellenti per canditi.

LIMEQUAT

Incrocio tra il lime e kumquat, molto profumato. Si può mangiare con la buccia, sapore agrodolce.

ARANCIO MORO SANGUINELLO

Arance di media dimensione con buccia rossa intensa variabile a seconda del periodo di raccolta. Polpa con screziature rosse nel sanguinello che tendono al vinoso nel moro. Maturazione tardiva febbraio-marzo.

MANDARANCIO SATSUMA MIYAGAWA

Pianta originaria del Giappone di piccole dimensioni e foglia medio piccola. Frutto simile al mandarancio facile da sbucciare senza semi. Maturazione molto precoce fine settembre ottobre.



Fitocella

Vaso 20
innesto basso

Vaso 24

Vaso 28

Vaso 33

Vaso 45



I frutti sono grandi, allungati, con scorza gialla molto spessa che può essere liscia o rugosa, la polpa è bianca poco succosa ed ha un sapore acidulo. Se ne utilizza soprattutto la scorza per ottenere lo sciroppo di cedro e per l'estrazione di oli essenziali.

BERGAMOTTO

I fiori sono profumatissimi, numerosi e bianchi. Il frutto è a forma sferica, di colore dal verde al giallo, buccia sottile e liscia. I frutti non si mangiano freschi, ma vengono usati per fare canditi e conserve.

CHINOTTO

Pianta ornamentale compatta con foglie piccole ed internodo corto, completamente privo di spine, ha fiore bianco molto profumato. I frutti arancioni e schiacciati simili al mandarino sono amari ed adatti alla produzione di succhi, canditi e confezioni.



Citrus maxima, è il più grande degli agrumi e può produrre frutti dal peso di diversi chili. Buccia spessa e con la parte bianca, albedo, molto spessa. Facile da sbucciare ha spicchi grandi e tipico sapore dolce.



Pianta molto vigorosa. Portamento compatto. Le foglie sono di colore verde scuro ed ovate. Frutti molto grossi, rotondeggianti, giallo-rosa a seconda della varietà, polpa amarognola, compatta e molto succosa. Maturità a fine autunno. Fioritura bianca in primavera.

MAPO

Ibrido con caratteristiche intermedie tra il mandarino (*Citrus reticulata*) e il pompelmo (*Citrus paradisi*). Più precisamente tra il mandarino "Avana" e il pompelmo "Duncan", molto precoce. I suoi frutti hanno una buccia molto sottile che resta in buona parte verde anche a piena maturazione. La polpa, giallo-arancio uniforme, ha un sapore gradevolmente acido. È un albero di vigoria medio-forte, a portamento globoso espanso, con rami tendenti a piegarsi verso il basso e presentanti spine solo su quelli più vigorosi.

Produzioni: piccoli frutti

Tutte le piante sono coltivate in vasi originali con scanalature per l'antispiralizzazione delle radici. L'apparato radicale cresce dritto garantendo l'attecchimento e la crescita delle piante.

Prepariamo in azienda il terriccio di coltivazione usando concime a lenta cessione con microelementi e con preziosa sostanza organica. Elevata self-life su tutta la gamma.

Accurata cartellinatura con foto, maturazione, codifica EAN, codice QR e consigli tecnici di coltivazione.

VASO ANTISPIRALIZZAZIONE

le radici non girano
attecchimento immediato
e crescita doppia



Vaso 7x7
per impianti



Vaso 12x11x11
It 1,5



Vaso 18x13x13
It 2,5



Vaso 23x18x18
It 6,5

Imballo e spedizione piccoli frutti e rose

Imballi accurati su pallet, carrelli CC e sui nuovi espositori in legno, per accontentare ogni esigenza del cliente. Spedizioni in Italia e in Europa con corriere espresso. Tutte le piante vengono consegnate in tempi brevi. Assistenza post vendita del cliente e del rivenditore.



Pedana EPAL

60 vasi 23x18x18 lt 6,5

Pedana EPAL

100 vasi 18x13x13 lt 2,5



Espositore legno 4 ripiani

opzione 1

140 rose 20x15x15cm 3,5lt

opzione 2

280 piccoli frutti 12x11x11 lt 1,5

opzione 3

70 rose 20x15x15cm 3,5lt

140 piccoli frutti 18x13x13cm lt 2,5



new



Espositore light

opzione 1

80 rose 20x15x15cm 3,5lt

opzione 2

140 piccoli frutti 12x11x11 lt 1,5

opzione 3

40 rose 20x15x15cm 3,5lt

70 piccoli frutti 12x11x11 lt 1,5

Espositore legno 2 ripiani

opzione 1

100 rose 20x15x15cm 3,5lt

opzione 2

120 piccoli frutti 18x13x13cm lt 2,5

opzione 3

50 rose 20x15x15cm 3,5lt

60 piccoli frutti 18x13x13cm lt 2,5

Piccoli frutti

Lampone *Rubus idaeus L.* (Rosaceae)

EN. Raspberry FR. Framboisier DE. Himbeerstrauch ES. Frambuesero


DESCRIZIONE: Pianta arbustiva di altezza compresa tra gli 80 e i 250 cm, con ceppaia perennante e rami biennali parzialmente eretti detti polloni nel primo anno e rami fruttiferi nel secondo. In molte varietà anche il pollone fruttifica al primo anno. Le varietà si distinguono in UNIFERE che producono frutti grandi in un solo periodo e RIFIORENTI che producono per più mesi.

IMPIANTO: Può essere coltivata in tutta Italia, predilige terreni sciolti, su terreni pesanti nella buca aggiungere torba concimata. Le piante vanno disposte su file a distanza di 40-50 cm sulla fila e 200-250 cm tra le file. È opportuno predisporre un filare composto di pali a distanza di 200 cm l'uno dall'altro e tre fili di sostegno ai quali andranno assicurati i rami principali.

COLTIVAZIONE: Coltura rustica, richiede poche cure, irrigazioni di soccorso nel periodo estivo e concimazione minerale equilibrata con prevalenza di azoto in primavera e concimazione organica in autunno inoltrato. **Può essere coltivato anche in vaso** curando l'irrigazione frequente e la concimazione con concimi a lento rilascio o con fertirrigazione.

POTATURA: Si asportano in inverno i rami di due anni che hanno fruttificato e se necessario si diradano i polloni di un anno.

TRATTAMENTI: In ambienti asciutti e per coltivazioni hobbistiche di solito non sono necessari trattamenti anticrittogamici, tuttavia sono raccomandati due interventi il primo in autunno ed il secondo alla ripresa vegetativa con Sali di rame e zolfo bagnabile per prevenire le principali avversità.



	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre
Cultivar di lampone rosso:					
UNIFERI					
Meeker	-----				
Tulameen		-----			
Black		-----			
RIFIORENTI					
Heritage "O"		-----			
Autumn			-----		
Heritage			-----		
Rossana				-----	
Scepter				-----	
Cultivar di lampone giallo:					
Gold			-----		

Mora gigante senza spine *Rubus fruticosus* (Rosaceae)

EN. Blackberry FR. Ronce DE. Brombeerstrauch ES. Zarzamora

DESCRIZIONE: Pianta arbustiva di altezza compresa tra gli 80 e i 250 cm, con ceppaia perennante e rami biennali parzialmente eretti detti polloni nel primo anno e rami fruttiferi nel secondo. La produzione avviene esclusivamente su rami fruttiferi. Fogliame persistente, finemente frastagliato. Eccellente per decorare muri, pergole, staccionate, ecc... Produce durante l'estate grossi frutti neri, molto dolci. Disponiamo di diverse varietà, a portamento eretto o strisciante.

IMPIANTO: Può essere coltivata in tutta Italia, predilige terreni sciolti, su terreni pesanti nella buca aggiungere torba concimata. Le piante vanno disposte su file a distanza di 40-50 cm sulla fila e 200-250 cm tra le file. È opportuno predisporre un filare composto di pali a distanza di 200 cm l'uno dall'altro e tre fili di sostegno ai quali andranno assicurati i rami principali.

COLTIVAZIONE: Coltura rustica, richiede poche cure, irrigazioni di soccorso nel periodo estivo e concimazione minerale equilibrata con prevalenza di azoto in primavera e concimazione organica in autunno inoltrato. **Può essere coltivato anche in vaso** curando l'irrigazione frequente e la concimazione con concimi a lento rilascio o con fertirrigazione.

POTATURA: Si asportano in inverno i rami di due anni che hanno fruttificato e se necessario si diradano i polloni di un anno.

TRATTAMENTI: In ambienti asciutti e per coltivazioni hobbistiche di solito non sono necessari trattamenti anticrittogamici, tuttavia sono raccomandati due interventi il primo in autunno ed il secondo alla ripresa vegetativa con sali di rame e zolfo bagnabile per prevenire le principali avversità.

APICE PIANTE
MICROPROPAGAZIONE E VIVAISMO DI QUALITÀ

La buona frutta

mora gigante senza spine precoce

NOTE INFORMATIVE SUL RETRO

APICE PIANTE
MICROPROPAGAZIONE E VIVAISMO DI QUALITÀ

La buona frutta

MORA GIGANTE SENZA SPINE PRECOCE

Descrizione: Pianta sarmentosa eccellente per decorare muri, pergole e staccionate. Produce grossi frutti neri molto dolci. Maturazione a giugno.

Utilizzo: I frutti sono ricchi di vitamine A, C ed E. Sono adatti per il consumo fresco e per la preparazione di ottime marmellate. Ottimi anche per essere surgelati e per torte e gelati.

CONSIGLI DI COLTIVAZIONE

Suolo: Pianta rustica, si adatta su tutti i tipi di terreno. ANCHE IN VASO SI PUÒ!! Utilizzando un vaso di almeno Ø28cm (5lt), è necessario usare terriccio organico e irrigare quanto occorre, evitando ristagni d'acqua.

Epoca d'impianto: La pianta in vaso può essere trapiantata durante tutto l'anno. Si consiglia di interrare a livello del terreno coprendo la superficie della zolla con 2cm di terriccio.

Potatura: Eliminare i rami che hanno fruttificato. Legare i nuovi polloni ai sostegni e spuntarli durante l'estate.

Concimazione: Alla fine dell'inverno, dopo l'ingrossamento delle gemme, usare un concime organico integrandolo con azoto (es. nitrato ammonico) e microelementi. E' buona norma concimare con piccole dosi anche a fine estate. Dopo la distribuzione il concime va interrato leggermente.

Per maggiori informazioni visita il nostro sito: www.apicepiante.com

SERVIZIO FITOSANITARIO ABRUZZO
QUALITÀ CE - 1° CAT. C.A.C.
COD. FORNITORE
R.U.P. 01321190694

APICE PIANTE
MICROPROPAGAZIONE E VIVAISMO DI QUALITÀ

La buona frutta

mora gigante senza spine tardiva

NOTE INFORMATIVE SUL RETRO

Precoci:

	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre
Arapaho	-----				
Dirksen		-----			
Black Satin	-----				

Tardive:

	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre
Lochness		-----			
Chester		-----			
Navaho		-----			

Piccoli frutti

Mirtillo *Vaccinium sp* (Ericaceae)

EN. Highbush blueberry FR. Mirtillier arbustif DE. Heidelbeerstrauch ES. Arandano gigante

DESCRIZIONE: Pianta arbustiva cespugliosa a portamento eretto, di altezza compresa tra 100 e i 200 cm, con rami e branche semi legnose e fogliame caduco che assume belle colorazioni autunnali, fioritura decorativa. Grossi frutti blu-violaceo, abbondanti, molto apprezzati freschi o in marmellata. La produzione avviene soprattutto nei rami di due o più anni da gemme miste o a fiore. I fiori, generalmente autofertili sono riuniti in grappoli cilindrici. L'impollinazione è facilitata dall'entomofauna. Foglie caduche di forma ovato-allungata, in autunno acquistano il tipico colore rosso. Pianta perenne che può produrre anche per molti decenni.

IMPIANTO: Può essere coltivata in tutta Italia ma teme la siccità e i terreni calcarei. Predilige terreni sciolti, ben dotati di sostanza organica e tendenzialmente acidi, in mancanza, aggiungere nella buca torba concimata acida. Nelle regioni calde può essere protetta da teli ombreggianti. Richiede frequenti annaffiature. Distanza di piantagione: 0,50 a 1 m sulla fila e 200-250 cm tra le file.

COLTIVAZIONE: Coltura rustica, richiede poche cure, irrigazioni di soccorso nel periodo estivo e concimazione minerale equilibrata con prevalenza di azoto in primavera e concimazione organica in autunno inoltrato. **Può essere coltivato anche in vaso** curando l'irrigazione frequente e la concimazione con concimi a lento rilascio o con fertirrigazione.

POTATURA: Alla piantagione raccorciare leggermente i rami; gli anni seguenti, eliminare i rami vecchi e favore dei nuovi più vigorosi e diradare la chioma per favorire l'illuminazione. Potare durante l'inverno.

TRATTAMENTI: In ambienti asciutti e per coltivazioni hobbistiche di solito non sono necessari trattamenti anticrittogamici, tuttavia sono raccomandati due interventi il primo in autunno ed il secondo alla ripresa vegetativa con Sali di rame e zolfo bagnabile per prevenire le principali avversità.



Precoci:

	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre
Bluetta	-----				
Duke	-----				
Spartan	-----				

Medie:

	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre
Blue ray		-----			
Berkeley		-----			
Goldtraube		-----			

Tardive:

	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre
Legacy		-----			
Coville		-----			
Elisabeth		-----			
Elliot		-----			

Rosso:

	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre
Americano Cranberry				-----	

Ribes rosso *Rubus idaeus* L. (Rosaceae)

EN. Red currant FR. Grosseiler DE. Rote Johannisbeere ES. Grosella roja

Frutti a grappoli, adatti per consumo fresco, dolci e confetture. Il gruppo comprende cultivar a frutto bianco e rosso. Maturazione giugno-luglio.

Ribes nero *Rubus idaeus* L. (Rosaceae)

EN. Black currant FR. Cassissier DE. Schwarze Johannisbeere ES. Grosella negra

Le foglie e le bacche emanano un forte odore tipico per la presenza di ghiandole odorose ricche di oli essenziali. I frutti neri riuniti a grappolo sono ricchissimi di vitamina C, antocianine, acido ascorbico, sono usati per la produzione di succhi e per confetture. Maturazione giugno-luglio.



DESCRIZIONE: Pianta arbustiva cespugliosa basitona, abbastanza vigorosa, di altezza compresa tra i 50 e i 200 cm, con rami e branche eretti, la produzione avviene soprattutto nei rami di due anni da gemme miste o a fiore. I fiori, generalmente autofertili sono riuniti in racemi penduli (grappoli). Foglie caduche, semplici palmato lobate a margine dentato più o meno arrotondato.

IMPIANTO: Può essere coltivata in tutta Italia ma teme la siccità, predilige terreni sciolti, su terreni pesanti nella buca aggiungere torba concimata. Nelle regioni calde va piantata in luoghi semiombreggiati. Richiede frequenti annaffiature. Distanza di piantagione: 0,80 a 1 m sulla fila e 200-250 cm tra le file.

COLTIVAZIONE: Coltura rustica, richiede poche cure, irrigazioni di soccorso nel periodo estivo e concimazione minerale equilibrata con prevalenza di azoto in primavera e concimazione organica in autunno inoltrato. **Può essere coltivato anche in vaso** curando l'irrigazione frequente e la concimazione con concimi a lento rilascio o con fertirrigazione.

POTATURA: Alla piantagione lasciare 2 o 3 gemme per ramo; gli anni seguenti, conservare da 6 a 8 rami ed eliminare i rami che hanno prodotto. Potare a fine inverno.

TRATTAMENTI: In ambienti asciutti e per coltivazioni hobbistiche di solito non sono necessari trattamenti anticrittogamici, tuttavia sono raccomandati due interventi il primo in autunno ed il secondo alla ripresa vegetativa con Sali di rame e zolfo bagnabile per prevenire le principali avversità.



	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre
Cultivar di ribes rosso:					
Junifer		-----			
Rovada		-----			
Cultivar di ribes bianco:					
Zitavia		-----			
Hollander		-----			
Blanca		-----			
Cultivar di ribes nero:					
Black		-----			
Titania		-----			
Goliath		-----			

Piccoli frutti

Uva spina *Ribes grossularia* L. (Sassifragaceae)

EN. Gooseberry FR. Groseilleur épineux DE. Stachelbeerstrauch
ES. Grosella espinosa

DESCRIZIONE: Pianta arbustiva cespugliosa poco vigorosa, di altezza compresa tra 50 e i 150 cm, con rami e branche spinose, la produzione avviene soprattutto nei rami di due anni da gemme miste o a fiore. I fiori, generalmente autofertili sono singoli anche di grandi dimensioni.

IMPIANTO: Può essere coltivata in tutta Italia ma teme la siccità, predilige terreni sciolti, su terreni pesanti nella buca aggiungere torba concimata. Distanza di piantagione: 0,50 a 1 m sulla fila e 200-250 cm tra le file.

COLTIVAZIONE: Coltura rustica, richiede poche cure, irrigazioni di soccorso nel periodo estivo e concimazione minerale equilibrata con prevalenza di azoto in primavera e concimazione organica in autunno inoltrato. **Può essere coltivato anche in vaso** curando l'irrigazione frequente e la concimazione con concimi a lento rilascio o con fertirrigazione.

POTATURA: Alla piantagione lasciare 2 o 3 gemme per ramo; gli anni seguenti, conservare da 6 a 8 rami ed eliminare i rami che hanno prodotto. Potare a fine inverno.

TRATTAMENTI: In ambienti asciutti e per coltivazioni hobbistiche di solito non sono necessari trattamenti anticrittogamici, tuttavia sono raccomandati due interventi il primo in autunno ed il secondo alla ripresa vegetativa con Sali di rame e zolfo bagnabile per prevenire le principali avversità.

Cultivar:

Hinnonmaki Rot: Rossa, frutto medio-grande, dolce. Maturazione da metà giugno a metà luglio.

Rokula: Rossa, frutto grande, maturazione da fine giugno a inizio agosto.

Hinnonmaki Gelb: Bianca, frutto molto grande e dolce. Maturazione dalla terza decade di giugno alla seconda di luglio.



Goji

Lycium barbarum L. (Solanaceae)

Il Goji è un arbusto che cresce verticalmente, anche fino ai 3 metri di altezza. I suoi frutti, le bacche di Goji, note anche come “**frutti della longevità**” o “**frutti della vita**”, sono coltivate nelle valli Himalayane, del Tibet, della Cina del Nord e della Mongolia, e sono conosciute nel mondo per le loro straordinarie qualità nutritive.

Sono infatti particolarmente ricche di antiossidanti naturali, vitamine e sali minerali, polisaccaridi, carotenoidi e flavonoidi, diventando quindi un alimento eccezionale per il benessere dell'organismo.

La bacca è caratteristica, di un colore rosso acceso e assomiglia ad una ciliegia rimpicciolita e allungata, con un gradevole gusto dolce.



Aronia

Aronia melanocarpa (Rosaceae)

Detta anche “Aronia nera”, CHOKEBERRY, è un arbusto a foglia caduca, a portamento eretto, di medie dimensioni, originario dell'America settentrionale. Foglie lanceolate, di colore verde lucente che diventano rosso porpora scuro in autunno, prima di cadere.

A tarda primavera sbocciano i fiori bianco-rosati e nella tarda estate ai frutti seguono dei piccoli frutti rotondi, penduli, neri a maturazione.

I frutti hanno la dimensione di un pisello e sono ricoperti da un leggero strato di cera, con sapore dolce, leggermente acidulo e astringente, simile al mirtillo. Possono essere trasformati in succhi di frutta oppure consumati freschi ben maturi o appassiti.

Specie molto rustica, in grado di resistere a temperature molto rigide. Tollera anche l'inquinamento e l'aria salmastra delle zone marine. Teme invece i terreni calcarei, eccessivamente argillosi ed asfittici.

Per via dell'elevato contenuto di flavonoidi, vitamina K e vitamina C, l'aronia è considerata una pianta medicinale.



Fragola *Fragaria Spp., Fragaria vesca L. (Rosaceae)*

EN. Strawberry FR. Fraise DE. Erdbeerpflanze ES. Fresa

DESCRIZIONE: È una pianta erbacea perenne senza fusto, dotata di rizoma dal quale si dipartono stoloni, foglie ternate con lungo picciolo, fiori bianchi autofertili. Si divide in fragole di campo e fragole di bosco. Tra le prime, esistono diverse varietà, alcune dette rifiorenti, altre di stagione.

IMPIANTO: Distanza di piantagione: 30-35 cm tra le file se binate, 20-25 cm se singole e 100-120 cm tra le file.

È preferibile effettuare una baulatura del terreno e la successiva pacciamatura con telo in plastica biodegradabile nero, in questo modo i frutti non toccano a terra e restano sani.

COLTIVAZIONE: Coltura semplice ma richiede alcune cure come irrigazioni mediante una linea gocciolante posta sotto la pacciamatura e concimazione minerale equilibrata. **Può essere coltivata anche in vaso** curando l'irrigazione frequente e la concimazione con concimi a lento rilascio già presenti sul ns terriccio.

Cultivar:

Rifiorenti: Fioriscono e fruttificano dalla primavera all'autunno, media pezzatura, sapore dolce e profumate, molto adatte per gli orto famigliari.

Unifera: Varietà a frutto molto grande e produttive, unica maturazione da marzo a metà maggio.

Rampicanti: Così dette perché stolonifere la pianta madre si allarga facilmente conquistando il terreno circostante. Rifiorenti a frutto medio-piccolo, maturazione da giugno a settembre.



Mirtillo siberiano

Lonicera caerulea Kamtschatica (Caprifogliacee)

È originario della penisola asiatica della Kamtschatica. È un arbusto a foglia caduca di modeste dimensioni, rusticissimo per quanto riguarda il clima e molto longevo.

I piccoli fiori, bianchi e molto profumati, sbocciano ad inizio primavera e non hanno problemi di allegagione anche con temperature di -8/10°C. È specie autofertile, tuttavia la vicinanza di più piante assicura una maggiore produzione. La maturazione dei frutti, nei nostri climi italiani, avviene circa verso la fine di aprile. Il frutto è simile ad una bacca, di colore bluastrò come quello del mirtillo comune, ma molto più stretto ed allungato (fino a circa 2 cm.).

La buccia sottile e i semi molto piccoli, li rendono adatti sia al consumo fresco, sia nella preparazione di succhi e confetture. Sono ricchi di vitamina C e D, acido ascorbico e antociani. Il sapore è un mix dolce-acidulo che richiama il mirtillo, il ribes e lampone a seconda del grado di maturazione. Il mirtillo siberiano si adatta a quasi tutti i tipi di terreno anche se preferisce quelli sub-acidi. Pianta rusticissima, tollera tranquillamente temperature anche di -30°C.



Mirtillo rosso americano

Vaccinium macrocarpon, Ait (Ericaceae)

IL MIRTILLO ROSSO AMERICANO CRANBERRY è originario del nord est degli Stati Uniti. È un arbusto strisciante con piccole foglie e rami esili che si espandono fino ad un metro di diametro. Rusticissimo per quanto riguarda il clima è molto longevo.

I piccoli fiori, rosati con petali ricurvi, sbocciano ad inizio primavera e non hanno problemi di allegagione anche con temperature di -8/10°C. È specie autofertile, tuttavia la vicinanza di più piante assicura una maggiore produzione. La maturazione dei frutti avviene in autunno. Il frutto è una bacca rossa di discrete dimensioni con buccia sottile e seme molto piccolo. I frutti sono adatti sia al consumo fresco, sia nella preparazione di succhi e confetture. Sono ricchi di vitamina C e D, acido ascorbico, antociani e proantocianidine, hanno un effetto antibatterico ed antinfiammatorio.

Il sapore è un mix dolce-acidulo che richiama il mirtillo, il ribes e lampone a seconda del grado di maturazione.

Il mirtillo rosso si adatta a terreni acidi e torbosi e si adatta molto alla coltivazione in vaso. Pianta rusticissima, tollera tranquillamente temperature anche di -30°C.



Rose

Rose grandiflora rifioventi



Rose vaso 20x15x15
It 3,5



Rose polyantha
Rose mini
Rose rampicanti
Rose alberello

Disponibili
in diversi colori



Espositore legno 4 ripiani

opzione 1 140 rose 20x15x15cm 3,5lt



Rose alberello



Rose rampicanti

Impollinatori

Alcune specie e varietà sono **autocompatibili (AC)**, pertanto si autoimpollinano e producono anche se la pianta è singola. In altri casi varietà **autosterili** necessitano di impollinatori **(x) in rapporto da 1/1 fino a 1/10**. Nella maggior parte dei casi sono anche necessari gli insetti pronubi come api, bombici ecc, che trasportano il polline da un fiore ad un altro. Per nocciolo, olivo, castagno, l'impollinazione è affidata al vento.

ALBICOCCO X = compatibile AC = autocompatibile													
	TYRINTHOS "B"	ERRANI "O"	TYRINTHOS	ANTONIO ERRANI	PRECOCE IMOLA - BRUSA	SUNGIANT - GOLDRICH	HARCOT	BELLA D'IMOLA	SABBATANI	CAFONA	VITILLO	SAN CASTRESE	PALUMELLA
TYRINTHOS "B"	AC												
ERRANI "O"		AC											
TYRINTHOS			AC										
ANTONIO ERRANI				AC									
PRECOCE IMOLA - BRUSA					AC								
SUNGIANT - GOLDRICH							X	X				X	
HARCOT													
BELLA D'IMOLA								AC					
SABBATANI							X					X	
CAFONA									AC				
VITILLO											AC		
SAN CASTRESE												AC	
PALUMELLA													AC
PORTICI													AC
PRECOCE CREMONINI													AC
REALE D'IMOLA													AC
PISANA													AC

CILIEGIO X = compatibile AC = autocompatibile											
	BIGARREAU BURLAT	BIGARREAU MOREAU	GIORGIA	BIGARREAU NAPOLEON	ADRIANA	NEW STAR (autofertile)	SUNBURST (autofertile)	DURONE I	VAN	DURONE II	STELLA (autofertile)
BIGARREAU BURLAT		X	X						X		
BIGARREAU MOREAU	X		X			X	X	X			X
GIORGIA	X	X		X				X	X		X
BIGARREAU NAPOLEON	X				X			X			X
ADRIANA	X	X	X					X			X
NEW STAR (autofertile)						AC					
SUNBURST (autofertile)							AC				
DURONE I	X		X					X	X		X
VAN	X				X	X					X
DURONE II	X	X						X			
STELLA (autofertile)										AC	
FERROVIA			X		X	X					X
LAPINS (autofertile)											AC
DURONE III						X	X	X			X
VITTORIA "O" (autofertile)											AC

PERO X = compatibile V = parzialmente partenocarpico o parzialmente autocompatibile											
	BELLA DI GIUGNO	COSCIA PRECOCE	PRECOCE MORETTINI	SPADONA	SANTA MARIA	WILLIAM ROSSO	WILLIAM BIANCO	CONFERENCE	ABATE FETEL	DECANA DEL COMIZIO	KAISER
BELLA DI GIUGNO	V	X				X	X	X		X	
COSCIA PRECOCE						X	X				
PRECOCE MORETTINI	X			X					X		
SPADONA	X	X			X	X					X
SANTA MARIA	X				X	X		X		X	
WILLIAM ROSSO	X				V		X			X	
WILLIAM BIANCO	X				V	X		X			
CONFERENCE					X	X	V		X		
ABATE FETEL	X				X	X				X	
DECANA DEL COMIZIO					X	X	X	V			
KAISER					X	X	X		V		
BUTIRRA	X		X		X	X	X				X
PASSA CRASSANA					X	X	X				

MELO X = compatibile									
	OZARK GOLD	GALA ESTIVA	RED DELICIOUS "O"	SUPER STARKING	GOLDEN	RENETTA DEL CANADA	IMPERATORE-MORGENDUFT	FUJI	GRANNY SMITH
OZARK GOLD			X	X					X
GALA ESTIVA					X			X	X
RED DELICIOUS "O"		X			X			X	
SUPER STARKING		X			X			X	
GOLDEN		X				X	X	X	
RENETTA DEL CANADA					X				X
IMPERATORE-MORGENDUFT			X	X					
FUJI		X			X			X	
GRANNY SMITH		X			X			X	
ANNURCA		X		X				X	

SUSINO X = compatibile AU = autoimpollinante													
	MIRABOLANO	SHIRO-GOCIA D'ORO	SORRISO DI PRIMAVERA	OBILNAJA	SANTA ROSA	BLACK AMBER	OZARK PREMIER	SUSINO FORMOSA	REGINA CLAUDIA GIALLA	REGINA CLAUDIA VERDE	FORTUNE	FRIAR	SUN GOLD "O"
SORRISO DI PRIMAVERA	X	X			X								
SHIRO-GOCIA D'ORO	X		X		X		X						
OBILNAJA		X	X										
SANTAROSA	X	X						X					
BLACK AMBER	X				X						X		
OZARK PREMIER	X							X					
SUSINO FORMOSA					X								
REGINA CLAUDIA GIALLA										X			
REGINA CLAUDIA VERDE									X				
FORTUNE	X				X								
FRIAR	X				X	X							
SUN GOLD "O"											X		
STANLEY												AU	
GROSSA DI FELISIO												X	
PRESIDENT												X	X
FRIAR TARDIVA "O"	X		X	X							X		

ALTRI FRUTTI X = compatibile AC = autocompatibile													
	MANDORLO	S.CATERINA	TUONO	SUPERNOVA	FERRAGNES	FILIPPO CEO	GENCO	CASTAGNO	CASTAGNO TIPO	IBRIDO BOUCHE DE BETIZAC	NOCCIOLO	TONDA DELLE LANGHE	NOCCIOLO COMUNE
MANDORLO													
S.CATERINA													
TUONO			AC										
SUPERNOVA				AC									
FERRAGNES					X	X							
FILIPPO CEO						AC							
GENCO							AC						
CASTAGNO													
CASTAGNO TIPO										X			
IBRIDO BOUCHE DE BETIZAC									X				
NOCCIOLO													
TONDA DELLE LANGHE												X	X
NOCCIOLO COMUNE												X	
TONDA GENTILE ROMANA											X	X	
KAKO													
VANIGLIA													
KAKO TIPO-RAGNO (LOTO DI ROMAGNA)													AC
KAKO MERCATELLI												X	
KAKO CIOCCOLATINO												X	



Trattamenti antiparassitari

I parassiti e le malattie degli alberi sono purtroppo numerosi: esistono in commercio dei prodotti, spesso polivalenti, che vi aiuteranno a trattare efficacemente il problema.

Per quanto concerne i trattamenti, quello invernale è particolarmente importante: durante il periodo di riposo della vegetazione bisognerebbe trattare tutti gli alberi fruttiferi con dei prodotti a base di **rame o ziram** per le crittogame ed **olio bianco attivato** per contenere gli attacchi degli insetti; sempre durante l'inverno, le ferite su tronco e rami andranno protette con **mastice**, in particolare sugli alberi "con nocciolo" dove le ferite provocano colate di resina che indeboliscono le piante. Inoltre, alla ripresa vegetativa controllare soprattutto gli attacchi di afidi e cocciniglie con **aficidi sistemici o di contatto**. Qui di seguito riportiamo una breve descrizione delle patologie e dei possibili trattamenti riguardanti le diverse specie fruttifere:

CILIEGIO E SUSINO

Monilia: colpisce durante la fioritura e l'allegagione dei frutti ed in prossimità della maturazione degli stessi. L'utilizzo di prodotti contenenti "triforine" o "benzami-

dazolici" o "rameici" può aiutare.

Corineo e Antracnosi: si evidenzia con foglie bucherellate; è molto temibile per il defogliamento precoce e pertanto la difesa va fatta ogni anno alla ripresa vegetativa e dopo 15 gg con prodotti a base di Tiram o Dodina.

Cancro batterico (susino): maculature nerastre nella pagina inferiore delle foglie che poi disseccano e cadono anticipatamente. Trattare preventivamente con prodotti rameici in inverno e poi durante l'ingrossamento delle gemme.

Cocciniglie ed Afidi.

ALBICOCCO

Monilia: crittogama che causa imbrunimento dei fiori, disseccamento dei frutticini e disseccamenti dei rami e a seguire dell'intera pianta soprattutto se giovane. Le infezioni avvengono nei periodi molto umidi e freddi quindi la lotta deve essere eseguita a fine inverno e inizio primavera ogni 10-15 giorni con prodotti rameici meglio se sotto forma di Poltiglia Bordo-

Oidio: applicazioni preventive già dalle fasi di fine fioritura intervenendo con zolfo bagnabile e triforine inoltre si raccomanda di eliminare i rametti colpiti e, durante il diradamento, i frutticini colpiti.

PESCO

Bolla: lotta chimica principalmente preventiva con due o tre trattamenti di ditiocarbammati come Ziram o Tiram o Dodina, trattamenti alla caduta delle foglie ed a febbraio marzo soprattutto in annate fredde e piovose.

Corineo: di norma i trattamenti contro la bolla controllano questa crittogama che attacca soprattutto piante debilitate.

Anarsia (Tignola): fitofago la cui attività trofica danneggia le gemme, i germogli ed i frutti. Lotta chimica con insetticidi sistemici; tuttavia, a causa della resistenza sviluppata dal fitofago, è stata sperimentata la tecnica della confusione sessuale.

Afidi: l'utilizzo di aficidi sistemici può essere una buona soluzione.

MELO

Ticchiolatura: è la più temibile malattia fungina nel melo; la difesa ha inizio con un trattamento preventivo alla comparsa delle punte verdi o delle orecchiette di topo, con sali di rame o polisolfuro di calcio e prosegue poi con prodotti di copertura.

Oidio: uno o due trattamenti in pre-fioritura con prodotti sistemici specifici.

Carpocapsa: la difesa è basata sull'impiego di trappole sessuali

per decidere quando è opportuno trattare; di solito occorre intervenire con insetticidi che garantiscono una copertura di 25-30 giorni.

Ragnetto rosso: intervenire con acaricidi di provata efficacia avendo cura di non usare lo stesso prodotto per più di due volte per non favorire fenomeni di resistenza.

PERO

Ticchiolatura: come per il melo.

Psilla: arreca gravi danni imbrattando la vegetazione e soprattutto i frutti con una tipica melata scura che li rende incommerciabili; oggi viene operato il controllo biologico grazie all'azione di un insetto predatore, l' "Anthocoris nemoralis" oppure fosfororganici a largo spettro d'azione o l'uso di olii gialli (DNOC) alla ripresa vegetativa.

CASTAGNO

"Cancro della corteccia" e "Mal dell'inchostro": malattie dovute a due crittogame, l'infezione penetra nella pianta attraverso le ferite e con eccessi d'umidità anche per accumuli di foglie o sostanze organiche varie attorno al ceppo pertanto devono essere disinfettate con Sali di rame o Poltiglia Bordoese così da tenere la pianta in copertura nei periodi umidi e piovosi.

Indice

Azienda	2	Gelso	27	Uve da vino	53
Canna comune - Arundo donax	7	Giuggiolo	27	Agrumi	54
Cartellinatura	11	Kaki	25	Arancio	54
Certificati	10	Melo	26	Bergamotto	55
Imballo e spedizione piccoli frutti e rose	57	Nespolo	24	Cedro	55
Impollinatori	66	Pero	26	Chinotto	55
Il laboratorio di micropropagazione	8	Pesco	25	Kumquat	54
Piante micropropagate	9	Sorbo	27	Limequat	54
Piante per produzione intensiva	12	Susino	25	Limone	54
Produzioni: piccoli frutti	56	Frutti principali	28	Mandarancio	54
Sostenibilità	6	Albicocco	32	Mandarino	54
Trattamenti antiparassitari	67	Ciliegio	30	Mano di Buddha	55
Olivo	20	Fico	44	Mapo	55
Olivi	22	Kaki	46	Pomelo	55
Olivicoltura intensiva	20	Kiwi	47	Pompelmo	55
Novità - Frutti vitaminici e nutraceutici	16	Melo	40	Piccoli frutti	58
Asimina triloba	16	Pero	42	Aronia	62
Avocado	17	Pero Nashi	46	Fragola	63
Carciofo	18	Percoco o pesco da industria	39	Goji	62
Carrubo autofertile	17	Pesco	36	Lampone	58
Dragon fruit	17	Pesconoce o Nettarine	37	Mirtillo	60
Feijoa	16	Pesco Platicarpa	38	Mirtillo rosso americano	63
Limone caviale	16	Susino	34	Mirtillo siberiano	63
Melograno	19	Frutta secca	48	Mora	59
Nespolo gigante innestato	16	Castagno	48	Ribes	61
Tayberry	17	Mandorlo	50	Uva spina	62
Frutti antichi, resistenti alle malattie	24	Nocciolo	49	Rose	64
Azzeruolo	27	Noce	48	Alberello	65
Carrubo	27	Pistacchio	49	Grandiflora rifioranti	64
Ciliegio	24	Piante nane ornamentali	51	Mini	65
Corbezzolo	27	Uve	52	Polyantha	65
Cotogno	27	Uve da tavola	52	Rampicanti	65
Fico d'India	27	Uve da tavola resistenti alle malattie	53		



APICE PIANTE

MICROPROPAGAZIONE E VIVAISMO DI QUALITÀ

Uscita Autostrada A14
PESCARA SUD
FRANCAVILLA AL MARE

6 km in direzione **Guardiagrele**
sulla **SP 214 Fondovalle Foro**

GPS: 42.353570, 14.274357



Google Maps
Apice Piante



Website



WhatsApp



Social



Apice Piante del Dr. Agr. Roberto Di Primio
Via Val di Foro, 45 - 66010 RIPA TEATINA (CH) - Italy
Tel. e Fax +39 0871 399121 - Whatsapp +39 342 6689725
info@apicepiante.eu • commerciale@apicepiante.eu
www.apicepiante.eu

